


ပထမနှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၇၄၊ အုပ်ရေး ၂၅,၀၀၀။

ရန်ကုန်မြို့၊ ၅၂၉-၅၃၁ ကုန်သည်လမ်း၊

စာပေဗိမာန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထင်ကြီး (မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၀၄၈၀)က

တာဝန်ခံ ထုတ်ဝေသည်။



စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်အတွက်

ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၂၈၅-၂၇၇၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ အောင်ပန်းမြင်

ပုံနှိပ်တိုက်မှ ဦးအေးသိန်း ၀၁၆၉၃ (မြ)က ရိုက်နှိပ်ပေးသည်။

နိဒါန်း

- ၁။ အဘယ်ကြောင့် နွေရာသီတွင် ခြင်ကောင် ပေါများရသနည်း... ၁၁
- ၂။ နွေရာသီတွင် အနက်ရောင်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင် ထားသူများကို ခြင်ကောင်များ အဘယ်ကြောင့် ပို၍ ကိုက်ရသနည်း... ၁၂
- ၃။ ခြင်ကောင်အဖိုသည် သွေးမစုတ်တတ်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၁၃
- ၄။ ပျားသည် လှပသောပန်းကို လွယ်ကူစွာရှာ မေ့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၁၄
- ၅။ နံနက်ပိုင်းတွင် လိပ်ပြာများပျံသန်းရာ၌ အလွန်ထိုင်းမှိုင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၁၆
- ၆။ လိပ်ပြာများ အဘယ်ကြောင့် လှပချစ်စရာ ကောင်းသော အတောင်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသနည်း... ၁၇
- ၇။ ပုဇဉ်းများသည် အခြား ပိုးကောင်းများ ထက် ပိုပြီး လျင်မြန်စွာနှင့် ကြာရှည် ပျံသန်းနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ၁၉
- ၈။ ပုဇဉ်းများ ရေပက်ကစား ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၂၁
- ၉။ အလွန်ကွာဝေးသော သစ်နှစ်ပင်ကို ပင့်ကူသည် ဘယ်ကဲ့သို့ဆက်ပြီး အိမ်ဆောက်သနည်း... ၂၂
- ၁၀။ တီကောင်သီချင်းဆိုတတ်သလော။ ၂၃

www.burmeseclassic.com

- ၁၁။ တီကောင်သည် အဘယ်ကြောင့် မြေဆီ  
ကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်သနည်း... ၂၅
- ၁၂။ မြော့ကိုက်ခံရသောအခါ အဘယ်ကြောင့်  
သွေးများစွာ စီးကျရသနည်း... ၂၇
- ၁၃။ ဂဏန်းကောင်များ ပူဖောင်းပူတ် ကစား  
လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၂၈
- ၁၄။ ပုစဉ်းရင်ကဲ့၊ ပုရစ်နှင့် ကျိုင်းကောင်တို့တွင်  
အသံပြားပရှိပ အဘယ်ကြောင့် 'သီချင်း'  
ဆိုနိုင်ကြသနည်း... ၃၀
- ၁၅။ ပိုးကောင်များ 'ရည်းစားစကား' ထိုက်  
ပြောပုံ ၃၁
- ၁၆။ ပိုးကောင်ငယ်များ အဘယ်ကြောင့် အရေ  
ခွံလဲရသနည်း... ၃၃
- ၁၇။ ခြကောင်များ အဘယ်ကြောင့် အဆောက်  
အဦများကို ဖျက်ဆီးရသနည်း... ၃၄
- ၁၈။ ကျိုင်းကောင်များ အဘယ်ကြောင့်အုပ်စု  
လိုက်သောင်းကျန်းရသနည်း... ၃၆
- ၁၉။ ပုရွက်ဆိတ်များ အပြစ်စစ်တိုက်လေ့ရှိသည်။  
အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၃၈
- ၂၀။ ပျကောင်မေါများသည်နေရာတွင် ပုရွက်  
ဆိတ် ငေါဖျားလေ့ရှိသည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း... ၄၀
- ၂၁။ အဘယ်ကြောင့် ငါးများရေထဲတွင် မလှုပ်  
ရှားပဲ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေနိုင်သနည်း... ၄၂

- ၂၂။ ငါးများ တခါတရံ ရေပျက်နှာပြင်ပေါ်  
ခုန်တက်လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်  
နည်း... ၄၃
- ၂၃။ ငါးသေဆုံးသောအခါ အဘယ်ကြောင့်  
ဝမ်းပိုက်ပိုင်းသည် အပေါ်သို့ လန်နေရ  
သနည်း... ၄၄
- ၂၄။ ငါးအကြေးကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အဘယ်  
ကြောင့်ငါး၏သက်တမ်းကို သိနိုင်သနည်း... ၄၆
- ၂၅။ ငါးပူတင်းကိုစားလျှင် အဘယ်ကြောင့် အ  
ဆိပ်တောက်ရသနည်း ၄၇
- ၂၆။ မိုးရွာသောနေ့တွင် ဖားအော်သံ ပို၍ ကျယ်  
လောင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၄၉
- ၂၇။ မြေသည် အဘယ်ကြောင့် မိမိဦးခေါင်း  
ထက်ကြီးသော ကြွက်ကိုမျှချနိုင်သနည်း... ၅၀
- ၂၈။ မြေကိုအမြီးမှကိုင်ပြီး နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် လှုပ်  
ခါလျှင် ထိုမြေသေတော့သည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း... ၅၁
- ၂၉။ မြေတွင် ခြေမရှိပဲ အဘယ်ကြောင့် လျင်မြန်  
စွာ ရွေ့ရှားနိုင်သနည်း... ၅၂
- ၃၀။ မြေကိုရိုက်လျှင် 'ခုန်လက်မ' ကို ရိုက်ရ  
သည်။ မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်နည်း... ၅၄
- ၃၁။ မြေအလပွာယ်ဆရာ၏မြေသံကိုကြားသော်  
မြေဟောက်များ ထကကြသည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း... ၅၅

၂၂။ လိပ်မုားတွင် အဘယ်ကြောင့် မာကျော  
သော အခွံရှိသနည်း..... ၅၇

၂၃။ လိပ်ကျောပေ၀်တွင် စိုစွတ်နေပါက မိုးရွာ  
မည်ဟု သိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း..... ၅၉

၂၄။ အဘယ်ကြောင့် အချို့တိရစ္ဆာန်ငယ်များ  
သည် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကို ကြိုတင်  
သိရှိကြသနည်း..... ၆၀

၂၅။ ငှက်များ သစ်ကိုင်းပေ၀်တွင် နားအိပ်သော  
အခါ အဘယ်ကြောင့် ပြုတ်ကျခြင်း မဖြစ်  
သနည်း..... ၆၂

၂၆။ ပျံလွှားငှက်များ သမုတ္တရာကို ကျော်ဖြတ်  
ပျံသန်းစဉ် မည်သည့်နေရာတွင် အနားယူ  
သနည်း။ မည်သည့် အစာကို စားကြ  
သနည်း..... ၆၃

၂၇။ စင်ရော်များ အဘယ်ကြောင့် ပင်လယ်ကူး  
သင်္ဘော နောက် လိုက်ရသနည်း..... ၆၅

၂၈။ ဒေါင်းငှက်များသည် အရောင်အဆင်း လှ  
သော အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားသူကို မြင်လျှင်  
အမြီး ကားပြလေ့ ရှိ သည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း..... ၆၆

၂၉။ သာလိကာနှင့်ကြက်တူရွေးတို့သည် အဘယ်  
ကြောင့်လူစကားပြောတတ်သနည်း..... ၆၇

၃၀။ ကနောင် မင်းသမီးကို ဒေါင်းကိုက်စေ  
သော 'ဥနှင့်ကြက်'..... ၆၉

၄၁။ ကြက်မများ အဘယ်ကြောင့် အချိန်မှန်  
ဝပ်ကြသလဲ..... ၇၂

၄၂။ ကြက်မများ အပြီးသောအခါ အဘယ်  
ကြောင့် 'တဂို.ဂို.ဂို.ဂို.'ဟုအော်ရသနည်း..... ၇၄

၄၃။ 'မျက်နှာ' နီသောကြက်မသည် ဥအုလိမ်  
မည်ဟု ဆိုရိုးစကားရှိသည်။ အဘယ်သို့  
သော အဓိပ္ပာယ်နည်း..... ၇၅

၄၄။ ဆောင်းရာသီတွင် ကြက်မများကို လျှပ်စပ်  
မီးရောင်ထိုးပေးလျှင် ဥပိုအုသည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း..... ၇၇

၄၅။ ကြက်မပျိုကို မွေးခြင်းသည် ကြက်မအိုကို  
မွေးခြင်းထက် ပို၍ တွက်ခြေကိုက်သည်။  
အဘယ်ကြောင့်နည်း..... ၇၈

၄၆။ ကြက်မများ ပိုးကောင်များများ စားလေ  
ဥများများ အုလေဖြစ်သည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း..... ၈၀

၄၇။ ကြက်ငယ်များ ဥအကားမှ မောက်ထွက်လာ  
သည်နှင့် တပြိုင်နက် အစာ စားနိုင်သည်။  
အဘယ်ကြောင့်နည်း..... ၈၁

၄၈။ ဝမ်းဘဲများ ဥမဖောက်တတ်ချေ။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း..... ၈၃

၄၉။ ခွေးကအမဲရိုး၊ ကြောင်က ငါးဖိုး စားနိုင်  
သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း..... ၈၄

မာတိကာ

- ၅၀။ ဆပ်ကပ်ပွဲထဲမှ ခွေးကစားများ၊ ဂဏန်း သင်္ချာ တွက်တတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် နည်း... ၈၇
- ၅၁။ ဆပ်ကပ်ဆရာသည် ကြာပွတ်ကို အဘယ် ကြောင့် ကိုင်ဆောင်ထားရသနည်း... ၈၈
- ၅၂။ ယုန်နားရွက်ဘာကြောင့်အလွန်ရှည်ရသနည်း- ၉၀
- ၅၃။ ကြွက်များ အဘယ်ကြောင့် ပစ္စည်းများ ကိုက်ပြတ်ရသနည်း... ၉၂
- ၅၄။ ဆင်နှင့်ကြုံရေချိုးပြီးသော အခါ ကိုယ် ပေါ် ရွှံ့သံများ ပက်ပြန်းထေ့ရှိသည်။ အ ဘယ်ကြောင့်နည်း... ၉၃
- ၅၅။ သဘာဝအလျောက် သေဆုံးသောဆင်သေ အလောင်းကိုမည်သို့မူ မတွေ့ရချေ။အဘယ် ကြောင့်နည်း... ၉၄
- ၅၆။ သမင်ဖိုထွင် ဦးချိုပေါက်ပြီး အဘယ် ကြောင့် သမင်မထွင် မပေါက်သနည်း- ၉၆
- ၅၇။ ကုလားအုပ်သည်သင်္ကန္တာရတွင် ရေရှိသော နေရာကို သိနိုင်သည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း- ၉၈
- ၅၈။ နွားမများသီချင်းသံကြားသောအခါ နို့ပို့ ထွက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း... ၉၉
- ၅၉။ မျောက်များအလွန်အတုခိုးသည်။ အဘယ် ကြောင့်နည်း... ၁၀၀
- ၆၀။ မျောက်များ အဘယ်ကြောင့် စားပိုနှင့် အောငါး စားနိုင်ကြသနည်း... ၁၀၂

၈၇  
၈၈  
၉၀  
၉၂  
၉၃  
၉၄  
၉၆  
၉၈  
၉၉  
၁၀၀  
၁၀၂

နိဒါန်း

ဤစာအုပ်ကိုမဖတ်မီ သင့်တွင် “အဘယ်ကြောင့်” ဟူသော မရှင်းလင်းသည့် အရာများစွာ ရှိပေလိမ့်မည်။ မြွေပေးလမ္မာယံဆရာ ကြီး၏ ပြေသံကို ကြားသော် မြွေဟောင်းများ အဘယ်ကြောင့် ထကရသနည်း။ ငှက်များ သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် နားအိပ်သောအခါ အဘယ်ကြောင့် ပြတ်ကျခြင်း မဖြစ်သနည်း။ စင်ရော်များ အဘယ် ကြောင့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကိုလိုက်ပြီး ပျံသန်းရသနည်း။ မြွေများ အဘယ်ကြောင့် မိမိဦးခေါင်းထက် ကြီးသောကြွက်ကို မျိုချနိုင် သနည်း။ ငါးပုတင်းကိုစားလျှင် အဘယ်ကြောင့် အဆိပ်တောက် စေတတ်သနည်း။ ပင့်ကူအိမ်တွင် ကပ်နေသော ပိုးကောင်များ အဘယ်ကြောင့် အခွံခေါင်းလွတ်သာ ကျန်ရစ်ရသနည်း။ ဆင်နှင့် ကြုံ့သို့ ရေချိုးပြီးသောအခါ အဘယ်ကြောင့် ကိုယ်ပေါ်သို့ ရွှံ့သံ များ ပက်ပြန်းထားရသနည်း။ ဤကဲ့သို့ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသော သတ္တပညာ၏ အခြေခံသဘောတရားများကို ဤစာအုပ်တွင် စုံလင် စွာ တင်ပြထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့မြင်ချက်များကို အမှန်အမှတ်မဲ့ မရှုမူပဲ ဤအရာသည် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်ပျက်ရသည်၊ မည်သို့ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မည်။ မည်သို့ ပြုပြင် လျှင် ကောင်းမည် စသည်ဖြင့် အကြောင်းစစ်မြစ် ကို စစ်ကြော ထုတ်နုတ်ပြသားပြီး တရားပရိသတ်အားလည်း ဤသို့မြင်တတ် ရှိ တတ်။ စိတ်ကူးတတ်အောင် ဆွဲဆောင်ခေါ်ဝင်၍ ဆွေးနွေးတင်ပြ ထားပါသည်။

ဤစာအုပ်သည် သိပ္ပံဗဟုသုတများကို အရင်းတိုင်း ဖောက် သယ်မချုပ် လူတိုင်းကြိုတူးမြင်ဘူးသည့် ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်



များကို ဇာတ်လမ်းဆင်ကာ မသိမသာ ဖော်ပြသွားသည်။ ဤ စာအုပ်တွင် ပါဝင်သော မေးခွန်းများသည် လုပ်သားပြည်သူများ သာမက သတ္တပညာဆည်းပူးနေကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ များလည်း မေးသင့်၊ စဉ်းစားသင့်၊ သိထားသင့်သည့် မေးခွန်းများ ပင် ဖြစ်သည်။

ဤစာအုပ်သည် သတ္တဗေဒပညာကို ကျောင်းသူကျောင်းသား များ မြတ်နိုးစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်ဆိုလျှင် စာရေးသူအဖို့ ဤ စာအုပ်ကို ရေးရကျိုး နှင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း။

သိပ္ပံမျိုးသန့်




၁။ ။ အဘယ်ကြောင့် နွေရာသီတွင် မြင်ကောင် ပေါများရသနည်း

ဂျပန်သမိုင်းပုံပြင်တခုတွင် ဂျပန်စစ်သူကြီးတဦးသည် စစ်ရှုံးနိုင် သဖြင့် မြင်းစီးကာ လွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးလာရာ မြစ်ကမ်းပါးဘာ ခု သို့ ရောက်လေသော် အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော ရှုခင်းဘခု ကို တွေ့မြင်ရ၏။ ထိုရှုခင်းမှာ အခြားမဟုတ်။ ပုရွက်ဆိတ်များ သည် “စစ်သူကြီး ဤနေရာတွင် သေဆုံးရမည်” ဟူသည့် စာတန်းပုံ ဖော်ထားသည်ကို တွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်၏။ စစ်သူကြီးလည်း ပုရွက် ဆိတ်များ သရုပ်ဖော်ထားသည့် စာတန်းကိုဖတ်မိပြီး ဤမျှသေးငယ် လှသော ပုရွက်ဆိတ်များပင် ငါ့ကို သရော်နေချေပြီ ဟူ၍ တွေးတောကာ ကိုယ်လည်ပင်းကိုယ်ဖြတ်ပြီး အဆုံးစီရင်လိုက် လေသည် ဟု ဖော်ပြထားသည်။


ပုရွက်ဆိတ်များ ဘယ်ကဲ့သို့ ထိုစာတန်းကို သရုပ်ဖော်နိုင်ကြ သနည်း။ အမှန်မှာ ထိုစစ်သူကြီး၏ရန်သူဖက်မှအလွန်ပညာရှိသော အမတ်တဦးက စစ်သည်တော်တဦးကိုရှေးဦးစွာစေလွှတ်ပြီး သကြား မျှော်ရည်ဖြင့် ထိုကမ်းခြေတွင် ထိုစာတန်းကို ရေးထားစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုရွက်ဆိတ်များသည် သကြားနံ့ ရှိ၍ ပိုင်းအုစားသောက် ကြခြင်းဖြင့် စာတန်းပေါ်လာသည်။ ပုရွက်ဆိတ်များ အချို့ကိုက တတ်သည့်အချက်ကို အသုံးပြုပြီး စစ်သူကြီးကို သရော်စိတ်ဆိုးစေ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ပုရွက်ဆိတ်များသည် သကြားနံ့ ရသောအခါ အုံ့လာကြသည်။ ထို့အတူ ယင်ကောင်များသည်လည်း ညစ်ပတ်သောအခါက ပုံနှံ့ငါး



များပေါ်တွင် အံ့လေ့ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းမှာ မွေးကြိုင်သော ပန်းရနံ့သည် လူကိုဆွဲဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ သကြားနံ့နှင့်အမှိုက်ပုံနံ့တို့သည် ပုရွက်ဆိတ်နှင့် ယင်ကောင်တို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ လေ့လာချက်အရ ရာသီဥတုပူအိုက်သောအချိန်နှင့် လေထုစိုထိုင်းနေသောအချိန်များတွင် လူ၏အရွေ့မှ အာမိုးနီးယမ်းအက်စစ်ဓာတ်ဆား၊ လက်တစ်အက်စစ်ဓာတ်ဆားနှင့် အာမိုးနီးယမ်းဒြပ်ပေါင်းများ စိမ့်ထွက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ပူအိုက်၍ လျင်မြန်စွာ ပြိုနှံ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ။ ထိုဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ခြင်ကောင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် ခြင်ကောင်များသည် လူကိုလိုက်ပြီးထိုးလေ့တတ်သည်။ သို့ကြောင့် ပူအိုက်သောနေရာသီတွင် ခြင်ပေါများခြင်း ဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း အချို့စိမ့်ထွက်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ခြင်ကောင်ကို နှင်ထုတ်နိုင်သည်။ ဥပမာ အမွှေးတိုင် ခြင်မီးနှင့်ကြိုးစတမ်းကို မီးရှို့ခြင်းဖြင့် ခြင်ကိုနှင်ပစ်နိုင်သည်။



၂။ ။ နွေရာသီတွင် အနက်ရောင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားသူကို ခြင်ကောင်များ အဘယ်ကြောင့် ပို၍ ကိုက်ရသနည်း။


ခြင်ကောင်တွင် မျက်စေ့ကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ထိုမျက်စေ့ကြီးသည် ဦးခေါင်းပိုင်း၏ လေးပုံသုံးပုံခန့် ရှိသည်။ ထိုမျက်စေ့အစုံကို ပိုးကောင်ဗေဒတွင် 'ကွန်ပေါင်းမျက်စေ့' ဟု ခေါ်သည်။ ယင်းကို မျက်စေ့ဝယ်ပေါင်း ခြောက်မြားစွာဖြင့် အထပ်ထပ်တည်ဆောက်ထားသည်။ ထိုမျက်စေ့ကြီးတစ်ခုသည် အရာဝတ္ထုကို ခွဲခြားကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် အရောင်နှုန်းဆင်းနှင့် ပြင်းအင်းချင်း မတူသော အလင်းတန်းတို့ကိုလည်း ခွဲခြားနိုင်သည်။

ခြင်ကောင်သည် များသောအားဖြင့် မွေးမြိုက်သောအလင်းရောင်ကို နှစ်သက်သည်။ အလွန်မှောင်ခြင်း၊ လင်းခြင်းတို့ကို မနှစ်သက်ချေ။ သို့သော်လည်း ခြင်ကောင်အမျိုးပေါင်း မြောက်မြားစွာရှိခြင်းကြောင့် အလင်းရောင်အနည်းအများ ကြိုက်နှစ်သက်ပုံပမာဏချင်း တူညီကြလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ အချို့ခြင်ကောင်များသည် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားကြပြီး အချို့မူ မွန်းလွဲနှင့် ဆည်းဆာချိန်တွင် လှုပ်ရှားလေ့ရှိသည်။ မည်သည့်အချိန်အခါတွင် လှုပ်ရှားစေကာမူ အလင်းရောင်ကိုရှောင်ရှားကြရန် ကြိုးစားကြမြဲဖြစ်သည်။ နေ့လယ်ပိုင်းလှုပ်ရှားသည့် ခြင်ကောင်သည်လည်း မွန်းလွဲသုံးလေးနာရီလောက်မှ စတင်လှုပ်ရှားလေ့ရှိသည်။ ယုံကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အင်္ကျီအနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသောအခါ အလင်းတန်းမွှေးမြိုနေခြင်းကြောင့် ခြင်ကောင်၏အကြိုက် တွေ့လေတော့သည်။ အကယ်၍ အင်္ကျီဖြူဝတ်ဆင်ထားပါက အလင်းရောင် တောက်ပခြင်းကြောင့် ခြင်ကောင်သည် သင့်ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ကျီနက်ဝတ်ဆင်ထားသောသူသည် အင်္ကျီဖြူဝတ်ဆင်ထားသောသူထက် ခြင်ကောင် ပိုကိုက်ခြင်းခံရသည်။

၃။ ။ ခြင်ကောင်အဖိုသည် သွေးမစုတ်တတ်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

နွေရာသီတွင် လူကို ခုက္ခ အပေးဆုံးမှာ ခြင်ကောင်ဖြစ်သည်။ လူ့ကိုယ်ပေါ်တွင်နားပြီး သွေးစုတ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ထိုခြင်များကို ဖမ်းပြီးလေ့လာလျှင် ယင်းတို့သည် ခြင်ကောင်အမများသာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရလိမ့်မည်။

အဘယ်ကြောင့် ခြင်ကောင်အဖိုသည် သွေးမစုတ်တတ်သနည်း။ ခြင်ကောင်များ မည်ကဲ့သို့ သွေးစုတ်သည်ကို ဦးစွာလေ့လာကြည့်ကြဦးစို့။ ခြင်ကောင်၏ပါးစပ်အင်္ဂါသည် ပါးစပ်အပ်ချောင်း



ခြောက်ခုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ယင်းတို့မှာ အပေါ်နှုတ်ခမ်း၊ အပေါ်ပမားစေ့နှစ်ခု၊ အောက်ပမားစေ့နှစ်ခုနှင့် လျှာတို့ဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပမားစေ့တွင် သွားကလေးရှိသည်။ ထိုအပိုခြောက်ချောင်းသည် အောက်နှုတ်ခမ်းချိုင့်တွင် ရှိသည်။ ခြင်ကောင်အမသွေးစွန်းသော အခါ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ခေါင်းအောက်တွင် နောက်ပိုင်းသို့ ကွေးသည်။ ထိုနှုတ်ခမ်းဖြင့် အပိုများကို ထိန်းထားသည်။ အောက်ပမားစေ့ကို လူ၏ အရေခွံထဲသို့ ထိုးသွင်းသည်။ အခြားပါးစပ်အပိုများလည်း ထိုနေရာမှ ထိုးဝင်သွေးစုတ်သည်။ ခြင်ကောင်အဖို၏ ပါးစပ်အပိုချောင်းသည် ပျောက်ကွယ်နေသည်။ ယင်း၏အောက်ပမားစေ့သည် သွေးငယ်ပြီး ကိုနေသည်။ ထိုကြောင့် သတ္တဝါများ၏ အရေခွံထဲသို့ မထိုးသွင်းနိုင်ချေ။ ထိုကြောင့် ခြင်ကောင်အဖိုသည် သွေးမစုတ်နိုင်ပေ။ ခြင်ကောင်အဖို၏ အာဟာရဓာတ်သည် ပန်းဝတ်ရည်၊ သစ်ပင်ဝတ်ရည်နှင့် အခြားဝတ်ရည်တို့မှ ရသည်။ ယင်း၏သက်တမ်းသည် ၆ ရက်မှ ၇ ရက်သာဘာရှည်သည်။ ခြင်ကောင်အမ၏ အာဟာရဓာတ်သည် အထက်ဖော်ပြပါများအပြင် သတ္တဝါများ၏ သွေးကို စုတ်နိုင်သည်။ သွေးစုတ်ပြီးသော ခြင်ကောင်အမ၏ ဥသာလျှင် ရင့်ကျက်လိမ့်မည်။ ခြင်ကောင်အမ၏ သက်တမ်းသည် ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာမြင့်သည်။

**၄။ ။ ပျားများသည် လှသော ပန်းများကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။**


သင်္ဃန္ဓလပန်းခြံတို့ရောက်ဘူးပေလိမ့်မည်။ ပန်းခြံအတွင်းဝယ် ရာသီဥတုလိုက် ပန်းများဝေဝေဆာဆာပွင့်နေသည်ကို တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ထိုလှသောပန်းပွင့်များကို ပျားများအံ့ပြီး ပန်းဝတ်မှုနှင့် ပန်းဝတ်ရည်စုတ်နေကြသည်ကို သင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။ ပျားများ

သည် အဘယ်ကြောင့် အရောင်ရှိသောပန်းပွင့်၏ ပန်းဝတ်ရည်ကို သာ စုတ်ရသနည်း။ ပန်းဝတ်ရည်၏အမွှေးနံ့ကြောင့်လော၊ ပန်း၏ အရောင်အဆင်းကြောင့်လော။

ဤမေးခွန်းကိုမဖြေကြားမီ ပျားသည် ပန်းရနံ့နှင့် အရောင်ကို မည်ကဲ့သို့ခွဲခြားပုံကို ရှေးဦးစွာသိရှိထားရန်လိုသည်။

ပျားများသည် တွေ့ရာပန်းတိုင်းပေါ်တွင် နားခြင်းမဟုတ်။ ပန်းပွင့်များကို ရှေးချယ်ပြီးမှ နားကြသည်။ ပျားတွင် ဖောငွေဗွားဦးချိုတစ်ခု ရှိသည်။ ထိုသွေးငယ်သောဦးချိုလေးပေါ်တွင် ဂန္ဓာရုံအင်္ဂါရှိသည်။ ထိုဂန္ဓာရုံအင်္ဂါသည် ပန်းမျိုးစုံ၏အနံ့ကို ခွဲခြားနိုင်သည်ဖြစ် မျိုးမတူသော ပျား၏ပျားအိမ်များကိုလည်း ခွဲခြားနိုင်စွမ်းသည်။ ပျားအုပ်များတွင် မတူသော အနံ့များရှိကြသည်။ အနံ့တူသောပျားများ စုပြီး ပျားအိမ်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ ထို့ပြင် ပျားများသည် ယင်းတို့၏ဝမ်းပိုက်ပိုင်းမှ အမွှေးနံ့ သာနံ့ များကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ပျားများ ပန်းဝတ်မှုနှင့်ဝတ်ရည်စုတ်ယူသောအခါ ထိုအမွှေးနံ့သာကို ပန်းပေါ်တွင် ပြန်နံ့စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ထိုပန်းများကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။

၎င်းပြင် ပျား၏ကြီးမားသောမျက်လုံးတစ်ခုသည် ခြားနားသော အရောင်ရှိသည့် ပန်းပွင့်ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ပျား၏ ရူပါရုံအားနှင့် လူတို့၏ရူပါရုံအားကို မတူညီကြချေ။ ယင်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အလင်းလှိုင်းတိုများကိုသာ မြင်ကြရသည်။ သိပ္ပံပါရဂူများ၏လေ့လာချက်အရ ပျားသည် အနီ၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ခရမ်းရောင် စသည့် အရောင်လှိုင်းအလျားတို့ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပျားများသည် လှသောပန်းပွင့်များကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။



၅။ ။ နံနက်ပိုင်းတွင် လိပ်ပြာများ ပျံသန်းရာ၌ အလွန်ထိုင်းရှိုင်းကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

လိပ်ပြာတွင် လှပကျယ်ပြန့်သော တောင်ပံရှိသည်။ တခါတရံ ထိုတောင်ပံဖြင့်လေထဲပျံဝဲနေသည်။ အလွန်စိတ်ကြည်နူးစွယ်ကောင်းသော ချောင်းဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်း နံနက်ပိုင်းတွင်ပျံသန်းနေသော လိပ်ပြာများကို သင်မြင်လျှင် အံ့အားသင့်နေလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ နံနက်ပိုင်း လိပ်ပြာများပျံသန်းရာတွင် အလွန်ထိုင်းရှိုင်းနေသည်။ တောင်ပံကို အပေးကုန်ခတ်သော်လည်း အမြင့်သို့ပျံဝဲမတက်နိုင်ချေ။

အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသနည်း...။ အစာအိမ် ဝမ်းပိုက် ချောင်းနေရှ်လော။ ထိုသို့ကားမဟုတ်ပါ။ နံနက်ခင်း၏စိုထိုင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သာဖြစ်ပါသည်။

နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြေမျက်နှာပြင်သည် နေ၏အပူရှိန်ကြောင့် လေငွေ့အပေါ်သို့တက်မည်။ လိပ်ပြာသည် ထိုတက်လာသောလေငွေ့ကို တောင်ပံကြီးကားပြီး မည်းစိမ်းပျံဝဲနေနိုင်သည်။ အားထုတ်နေလေ့ရှိ ပေးပါးသွက် ဟုစွာဝဲနေနိုင်သည်။ နံနက်ပိုင်းတွင် မြေမျက်နှာပြင်အေးနေ၍၎င်း၊ လေထုသည်လည်း စိုထိုင်းနေ၍၎င်း လိပ်ပြာသည် နေ့လယ်ကဲ့သို့ ပလငွေ့ကြားတွင် ခိုကပ်ပျံဝဲခြင်း မပြုနိုင်သည့်ပြင် တောင်ပံကြီးနေခြင်းကြောင့် “ဆေးအတွက်ကြောင့် လေး” ဖြစ်နေသည်။

အခြားအကြောင်းတချက်မှာ လိပ်ပြာသည် မြက်ပင်နှင့်သစ်ရွက်များကြားတွင် အနားယူလေ့ရှိခြင်းကြောင့် နံနက်ခင်းတွင် နှင်း

များကြောင့်၎င်း၊ စိုထိုင်းသော လေထုကြောင့်၎င်း အတောင်ပံ စိုစွတ်နေသည်။ မိုးနေသော တောင်ပံသည် ပို၍ လေးလံမည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပျံသန်းရာတွင် အလွန်ခက်ခဲလှသည်။


၆။ ။ လိပ်ပြာများ အဘယ်ကြောင့် လှပချစ်စရာ ကောင်းသော အတောင်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသနည်း။

စာရေးသူ ငယ်ဇဉ်က ရောင်စုံလှပသည့် လိပ်ပြာများကို လိုက်လံဖမ်းပြီး ကစားမိသည်။ ဖမ်းမိသော လိပ်ပြာ၏ အတောင်များကို လက်ဖြင့် ထိရုံမျှဖြင့် လှပ ချစ်စရာကောင်းသော ရောင်စုံအပွင့်၊ အကွက်များ ပုဂံဇီးသွားပြီး လှပသည့် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော အတောင်တထပ် ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်ရသည်ကို ထိုစဉ်ကာလက မသိခဲ့ချေ။

လိပ်ပြာအတောင်ပေါ်ရှိ ချစ်စရာကောင်းသော ရောင်စုံအဆင်း အကွက်များသည် အတောင်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖုံးထားသည့် အကြေးမှုန်များ ဖြစ်သည်။

အကြေးပြားပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံရှိ၍ လိပ်ပြာတကောင်၏အတောင်ပေါ်တွင် ကွဲပြားခြားနားသော အကြေးပြား မျိုးစုံရှိသည်။

အကြေးပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၁၀ မှ ၁၀၀၀ ထိ အရေအတွက်ရှိသော အလျားလိုက် အရစ်များရှိသည်။ အနုမြိုခိုက်ကရှိ စကုပ်ဖြင့် ကြည့်သော် ထိုအလင်းယိုင်အားရှိသည့် အလျားလိုက် အရစ်များပေါ်တွင် အခြားအပိုးလွှာများ ဇာအုပ်မှာကဲ့သို့ အထပ်ထပ် တည်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ အရစ်များလေငွေ့ပလှပသော အရောင်များ ပို၍ ပေါ်လွင်လေ ဖြစ်သည်။ အကြေးပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထူးခြားသည့် ဆေးရောင်လုံးလေးများ ရှိသည်။ ထင်းကို ဓာတုဆေးရောင်ဟု ခေါ်သည်။ ထိုအရောင်






များသည် အလွန်လှပသော်လည်း အောက်စီဂျင်ဓာတ် တိုးခြင်း (Oxidation) ကြောင့်၎င်း၊ အပြန်အလှန် ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်၎င်း စသည့်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် အရောင်မှာ တဖြည်းဖြည်းခဲဖြူပြီး နောက်ဆုံး ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။ အချို့ သတ္တုဓာတ်ဒြပ်တွင် စုဆောင်းထားသည့် လိပ်ပြာပုံ အယ်လ်မီနီယမ်တွင် လိပ်ပြာအတောင် ဆေးရောင်ပျက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အပူချိန် အပြောင်းအလဲ ကြီးပြီး နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိုးမိသော အခန်းတွင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တုဓာတ် အယ်လ်မီနီယမ်များ စုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားသော အခါ အဝတ်နက်ခြင်း မှန်ပေါ်အုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားရသည်။ သို့မှသာ နေရောင်ခြည်ကြောင့် ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်ပြာအတောင်၏ အကြေးပြားပေါ်တွင် ရှေးဆေးရောင် (၀၁) ရှည်ဆေးရောင် တချိုးလည်း ရှိသည်။ ထိုဆေးရောင်သည် ရုပ်ဝတ္ထု မျက်နှာပြင်၏ သွေးခြားသော တည်ဆောက်ပုံကြောင့် ယင်းပေါ်သို့ ကျသော အလင်းဘက်ကို ပြန်ဟပ်ခြင်းသော်၎င်း၊ ယိုင်ခြင်းသော်၎င်း၊ ပိတ်ထားခြင်းသော်၎င်း ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် လှပသော ဆေးရောင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ထိုရူပဆေးရောင်သည် အောက်စီဂျင်ဓာတ် တိုးခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း စသည့် ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနောင်မပြောင်းလဲချေ။ ထို့ကြောင့် ယင်းသည် တည်မြဲသောဆေးရောင်ဖြစ်သည်။ ထိုရူပဆေးရောင်သည် မတူညီသော အလင်းတန်းအောက်တွင် မတူညီသော အလင်းနှင့်အရောင် ဖန်တီးပေးသည်။ ထိုခေတ်ဆေးရောင်နှင့် ရူပဆေးရောင်တို့သည် လိပ်ပြာများ၏အတောင်များကို ရှုမပြီးအောင် ဖန်တီးပေးသည်။

၇။ ။ ပုစဉ်းများ သခြားပိုးကောင်များ ထက်ပိုပြီး လျင်မြန်စွာနှင့် ကြာရှည်စွာ ပျက်စီးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

မိုးဦးကာလ မိုးမရွာမီနှင့် မိုးရွာပြီးစအချိန်တို့တွင် ပုစဉ်းများသည် ရေခိုးရေငွေ့များ ပြည့်ဝနေသည့် ကောင်းကင်ယံတွင် ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ပျံ့ဝဲနေလေ့ရှိကြသည်။ ပုစဉ်းသည် ကျွမ်းကျင်သော လေယာဉ်မှူးမောင်းသည့် လေယာဉ်ကဲ့သို့ ရှေ့နောက်၊ ဝဲယာ၊ အဟုန်ထိုးပျံ့ဝဲနိုင်သည်။ တခါတခံ ရဟတ်လေယာဉ်ကဲ့သို့ ကောင်းကင်တွင် တနေရာတည်းတွင် ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း သင်လိုက်ဖမ်းသောအခါ ကြယ်ကြွေသကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ ကောင်းကင်သို့ ထိုးတက်သွားပြီး ခဏကြာသော် သင့်နားသို့ ပြန်ရောက်လာလိမ့်မည်။ သင့်အား နောက်ပြောင်နေရော့သလားဟု ထင်ရသည်။

ပုစဉ်းသည် ပိုးကောင်လောကတွင် အမြန်ဆုံးပျံနိုင်သူဖြစ်သည်။ ယခင်က ပျား၏ပျံနှုန်းသည် ပိုးကောင်လောကတွင် အလွန်လျင်မြန်နေပြီ ဟုမှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ပျား၏ ပျံနှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၄.၅ မီတာ၊ အတောင် ၂၅၀ ကြိမ်ခတ်ရသည်။ ပုစဉ်း၏ပျံနှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၇ မီတာ၊ အတောင် ၂၀ ကြိမ်မှ ၃၀ ကြိမ်လောက် ခတ်ရန်လိုသည်။ ပုစဉ်း၏ပျံနှုန်းသည် လျင်မြန်ရုံတင်မက ကြာရှည်စွာလည်း တာဝေးပျံနိုင်သည်။ နှစ်စဉ် နွေအကုန်ပိုးကူးရာသီအကူးတွင် ပုစဉ်းများစွာသိသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းလယ်ကမ်းခြေမှ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ “ခရီးရှည်” ထွက်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုခရီးရှည်ကို လေယာဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ပတ်မရပ်မနားပျံသန်းသည် အချိန်လောက် ကြာရှည်စွာ ပျံသန်းနိုင်သည်။



နှစ်ပေါင်းသုံးသန်းမျှကာလကပင်လျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပုဇွန် အမျိုးမျိုး ရှိနေခဲ့၏။ ထိုအချိန်အခါက ပုဇွန်၏ တောင်ပံနှင့် ပုံ သဏ္ဍာန်သည် ယခုစားခတ်ကောင်နှင့် အလွန်သဏ္ဍာန်တူသည်။ တောင်ပံကို ဆန့်ကားလိုက်လျှင် အကျယ် ၇၀ စင်တီမီတာမျှရှိခဲ့ သည်။ မည်သူမျှစမ်းဝံ့လိမ့်မည်မဟုတ်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ပျံသန်းမှုအစဉ် မပြတ် တိုးတက်မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် ယင်း၏ ကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန် နှင့် တောင်ပံသည် ယခုခေတ်တွင် တွေ့မြင်ရသော ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ပုဇွန်၏တောင်ပံသည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှ အားကောင်းရ သနည်း။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်များ၏စူးစမ်းလေ့လာချက်အရ ပုဇွန်၏ ရင်အုပ်ပိုင်းတွင် အတောင်ကိုခတ်ရန် အလွန်အားကောင်းသန်မာ ထွေးကျွန်းသည့် ကြွက်သားများ ရှိသည်။ ယင်းနှင့် ပုဇွန်ရင်ကဲ့သို့ ပျံစဉ် တောင်ပံများသည် ရှေ့နောက်ပြိုင်တူလှုပ်ရှားသည်။ ပုဇွန် ၏ နှည်လျားသော တောင်ပံနှစ်ပုံသည် ပျံသန်းနေစဉ် ရှေ့ပိုင်း အတောင်ပံက အရှေ့ အပေါ်ပိုင်းသို့ ခတ်ရိုက်ပြီး နောက် ပိုင်း တောင်ပံက အောက်ပိုင်းသို့ခတ်ရိုက်သည်။ ထိုကြောင့် ပျံစဉ်နေစဉ် မလှုပ်ရှားပဲ ရပ်နေနိုင်သည်။ ထို့မဟုတ် ရှေ့သို့သော်ငိုင်း၊ နောက် သို့သော်ငိုင်း ပျံစဉ်နိုင်သည်။ ပျံသန်းနှုန်းလည်းလျင်မြန်သည်။ အထူး သဖြင့် ပုဇွန်သည် ကိုယ်ပေါ်ပါးပြီး တောင်ပံ ပြီးနောက်ခြားကြောင့် ငိုင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာသဏ္ဍာန်သည် ငိုင်း အလျင်နှုန်း ပြန်ပြန်နှင့်ခရီးခဝး ပျံသန်းရန်အတွက် ဖန်တီးပေးသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အခြား ပိုးကောင်များထက် ပိုပြီးပျံသန်းနိုင်သည်။


ပုဇွန်တွင် ကွန်ပေါင်း မျက်စေ့ရှိသည်။ ခေါင်းဘုလုံးသည် ကွန်ပေါင်း မျက်စေ့နှစ်လုံးဖြင့် ပြည့်နေသည်။ ကွန်ပေါင်းမျက်စေ့ တလုံးတွင် မျက်စိငယ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ မှ ၂၀,၀၀၀ ထိရှိသည်။ အခြားပိုးကောင်၏ ၁၀ ဆ ဖြစ်သည်။ ပုဇွန်၏ ကွန်ပေါင်းမျက်စေ့ သည် အခြားပိုးကောင်မျက်စေ့ကဲ့သို့ အနီးမှန်မဟုတ်ချေ။ စမ်းသပ် ချက်အရ ၅ မီတာမှ ၆ မီတာထိ မြင်နိုင်သည်။ ယင်း၏ခြေသုံးစုံတွင်

အလွန်ချွန်ထက်သော ဆူးများရှိသည်။ ပိုးကောင်များ ထိုဆူးဖြင့် ထိုးမိပါက ပြေးလွတ်ရန်လမ်းမရှိတော့ပေ။ ယင်းသည် ပျံသန်းနေ စဉ် ပိုးကောင်များကို ဖမ်းစားလေ့ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်းကြောင့် အခြား ပိုးကောင်များထက် ပို၍လျင်မြန်စွာ နှင့် ကြာရှည်စွာ ပျံသန်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။

၈။ ။ ပုဇွန်များ ‘ရေပက်ကစား’ ကြ သည်။  
အဘယ်ကြောင့်နည်း

ပုဇွန်များ ရေပေါ်တွင် ပျံဝဲကာ ‘ရေပက်ကစား’သည့် ကြည် နူးစွယ်ရာ ရှုခင်းကို ရှေးစာဆိုတော်များ၊ ခေတ်ဆန်းကဗျာ ဆရာ များ ဖွဲ့နွဲ့စပ်ဆိုလေ့ ရှိသည်။ ရှေးစာဆိုတော်များ ပုဇွန်ရေတွတ် သည်ကို ဖွဲ့နွဲ့စပ်ဆိုတတ်သော်လည်း အဘယ်ကြောင့် ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရ သည်ကိုမူ မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပေ။

ပုဇွန်များသည် အခြားပိုးကောင်များနှင့် မတူချေ။ ကလေး ၁၀ ၁ နှစ်မှ ၂-နှစ်အချိန်အတွင်း ရေတွင် နေထိုင် စားသောက် ရသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်နေရသည့် ပုဇွန်နှင့် မတူပေ။ ခြေသုံးစုံ ရှိသော်လည်း ပျံသန်းရန် တောင်ပံ မရှိချေ။ အောက်နှုတ်ခမ်းသည် အလွန်ရှည်ပြီး ရှေ့သို့ ဆန့်ထုတ်နိုင်သည်။ နှုတ်ခမ်း၏ ရှေ့တွင် ညှပ်နှိပ်ပြီး အစာညှပ်သော ကိရိယာဖြစ်သည်။ အနားယူနေချိန်တွင် အောက်နှုတ်ခမ်းကို ခေါက်ထားနိုင်ပြီး ပါးစပ် တခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။ ရေကန်တွင်းရှိ ခြင်္သေ့နှင့်အကောင် ငယ်များသည် ယင်း၏အစာဖြစ်သည်။ လူတို့ပြုစုမွေးမြူသော အခါ တီကောင်အပိုင်းအစနှင့် ပုစွန်ငယ်များ ကျွေးကြသည်။ ငြီးငြိမ်း လာသော ပုဇွန်ငယ်သည် ရေတွင် ပေါက်နေသော မြက်မှတ်နှင့် ရေပေါ်သို့ တက်လာပြီး အခွံလဲခြင်းဖြင့် ပုဇွန်ဘဝ အဖြစ်သို့ ရောက်လာသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ရသော ပုဇွန်-



၂၂

‘ရေပက်ကစားခြင်း’သည် အမှန်စင်စစ် ရေကစားနေခြင်းမဟုတ်ပဲ မျိုးပွားရန်အတွက် ရေကန်တွင်းသို့ ဥအုနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထိုရေထဲသို့ ဥအုနေသည့် အမူအရာကို ရှေးစာဆိုတော်များက ပုဇွင်းရေကစားသည်ဟု အဖြစ် စင်ဆိုထားခြင်းသာဖြစ်သည်။

၉။ ။ အလွန်ကွာဝေးသော သစ်နှစ်ပင်ကို ပင့် ကူ ဘယ်ကဲ့သို့ဆက်ပြီး အိမ်ဆောက်သနည်း

ချောင်းကလေးဘဝက် ကန်ပေါင်ရိုးရှိ သစ်ပင်နှင့် အခြားတဖက် ရှိ သစ်ပင်ကိုဆက်ပြီး ပင့်ကူအိမ်ဆောက်ထားသည်ကို တောနယ် များတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အိမ်ရှိ ထောင့်တထောင့်နှင့် အခြား အလွန်ဝေးသော ထောင့်တပထာင့်ကိုဆက်ပြီး ပင့်ကူအိမ်ဆောက် ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရမြဲဖြစ်သည်။ ပင့်ကူသည် ရေမကူးတတ်။ မပျံဝဲတတ်ပဲနှင့် ဤ“ကောင်းကင် ပိုက်ကွန်”ကို ဘယ်ကဲ့သို့ တည် ဆောက်ခဲ့သနည်း။

ပင့်ကူဝမ်းပိုက်၏ နောက်ပိုင်းတွင် “ချည်မျှင်စက်” များရှိပြီး ပင့် ကူမျှင်များသည် ထို“ချည်မျှင်စက်”၏ အပေါက်ငယ်မှ စီးထွက် လာသည်။

ပင့်ကူမျှင်သည် ပရိတင်းဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ပိုး နှင့်ဆင်တူသည်။ ဝမ်းပိုက်မှစီးထွက်ခါစတွင် ရေကပ်သော ‘ခက် ရည်’ဖြစ်ပြီး လေနှင့်ထိတွေ့သောအခါ မာပြီး ပိုးမျှင်ဖြစ်သွားသည်။

လူသားတို့ မြစ်ချောင်းကို ဖြတ်ကူးရန် တံတား ထိုးရသကဲ့သို့ ပင့်ကူသည်လည်း တဖက်ကမ်းကို ကူးရန်အတွက် “ကောင်းကင် တံတား” တည်ဆောက်ရသည်။

ပင့်ကူ ကောင်းကင်တံတားထိုးပုံမှာ များစွာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။ ပင့်ကူသည် ယင်းရပ်နေသော အမှတ်မှတဖက်ကမ်း

ရှိ သစ်ပင်ကိုမှီခိုသော အရှည်ရှိသည့် ပင့်ကူမျှင်ရှည်များကို ထုတ် လွှတ်ပြီး လေထဲတွင်ပျံဝဲစေသည်။ ထွင်းဖောက်မြှင်နိုင်သောပိုးမျှင် များလေထဲတွင် ဝဲနေသကဲ့သို့ထင်ရသည်။ ပင့်ကူသည် ယင်းရပ်နေ သောအမှတ်မှ မြေထောက်ဖြင့် ထိုပိုးမျှင်များကို အစဉ်မပြတ်ထိစမ်း နေသည်။

ရွတ်တရက် အမျှင်တမျှင်သည် မလှုပ်ရှားတော့ချေ။ ဤကဲ့သို့ မလှုပ်ရှားသောအမျှင်သည် လေတိုက်ခြင်းကြောင့် တဖက်ကမ်းသို့ ရောက်ပြီးသစ်ပင်နှင့်ပြိုကပ်နေပေပြီ။ ထိုအခါ ‘ကောင်းကင်တံတား’ အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။

အိမ်၏ယက်မသည် အလုံးပြီးရသကဲ့သို့ ပင့်ကူသည်လည်း ၎င်း အိမ်၏ယက်မဖြစ်သည့် ထိုသစ်ပင်နှစ်ဖက် ဆက်ထားသည့် ပထမဦး ဆုံးအမျှင်ပေါ်တွင် ခေါက်တံ့ခေါက်ပြန် သွားလာပြီး ကြီးမား သော “ယက်မ” ဖြစ်ရန် ပြုလုပ်သည်။

ထိုနောက် ထိုယက်မ၏အောက်တွင် ပြင်ပြီး အခြားယက်မတေ့ ပြုလုပ်ပြန်သည်။ ပင့်ကူအိမ်ကို (ပိုင်သ ဝိမ နှစ်မျိုး၏ ကြားတွင် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်တော့သည်။

၁၀။ ။ တီကောင် သီချင်း ဆိုတတ်သလော။ နား နှင့်မျက်စေ့ရှိသလော

သာမန်အားဖြင့် တီကောင်များသည် သီချင်းဆိုတတ်သည်ဟု လူအများ ယူဆကြသည်။ ရှေးစာဆိုတော်ကြီးများသည် တီကောင် များ၏အော်သံများကို သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော သီချင်း ဆိုသံဟူ၍ စေးကဗျာများတွင် ရေးစပ်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမှန်အားဖြင့် တီကောင်များတွင် အော်သံ ပြုလုပ်နိုင်သော အင်္ဂါမရှိ။ ထိုကြောင့် အသံမပြုလုပ်နိုင်ချေ။ တီကောင်များ ‘သီချင်း’ ဆိုတတ်သည်ဟု ရှေးစာဆိုတော်များ ရေးစပ်ခဲ့ခြင်းမှာ တီကောင်

www.burmeseclassic.com

တွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက် ပုန်းအောင်းလေ့ ရှိသော ပိုးကောင် များ၏ အော်သံများသာဖြစ်သည်။


တီကောင်တွင် နားလည်းမရှိချေ။ ထိုကြောင့် တီကောင်ကို နားပင်းဟုခေါ်သည်။ သို့သော်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်း သည့်မှာ တီကောင်၏နံ့ ဘေးတွင် အသံများ ပြုလုပ်ပါကတီကောင် သည် တုံ့ပြန်မှု အချက်ပြန်ပြသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ တီ ကောင်များ၏ အပြောများတွင် ထိတွေ့မှု ဆဲလ်များ ထွားကျင်း ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့မှု ဆဲလ်များသည် တနေရာတွင် စုနေဘတ်ပြီး အပြောကို အဖုအထစ်ပေါ်စေသည်။ တီကောင် အပြောများတွင် ထိုကဲ့သို့ အဖုအထစ်ငယ်ပေါင်း များစွာရှိ သည်။ ထိုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ သေးငယ်သော လှုပ်ရှားမှုများ ကို ချက်ခြင်း သိရှိနိုင်သည်။

တီကောင်တွင် အရာဝတ္ထုများ ကြည့်ရှုရန် မျက်ခေ့မရှိပေ။ သို့သော်လည်း အလင်း၊ အမှောင်ကို ခွဲခြားနိုင်သော အာရုံကြော များရှိသည်။ အကယ်၍ တီကောင်ကို အပေါက်ငယ် ဖောက်ထား သော မှောင်မဲသည့်ပွဲတွင် ထည့်ထားလျှင် နာရီအနည်းငယ်ကြာ သော် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လွှားသည်ကို တွေ့ရမည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ တီကောင်များ၏ ကိုယ်မုက်မှာပြင်တွင် အလင်းရောင် အာရုံဆဲလ်များ ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်၏ ရှေ့ပိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့သော အာရုံဆဲလ်များ ပို၍များသည်။ ထိုကြောင့်လည်း အလင်းနှင့် မအမှောင်ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ သေ ဘုယုအားဖြင့် တီကောင်သည် အလင်းရောင်ကို မနှစ်သက်ချေ။ ညတွင် လှုပ်ရှားသွားလာသော “ညမင်းသား” ဖြစ်သည်။

၁၁။ ။ တီ ကောင် သည် အဘယ်ကြောင့် မြေဆီ ကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်သနည်း

တီကောင်၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် နှစ်ဖက်ချွန်သော စက်ဝိုင်းပြွန် ချောင်းနှင့်တူသည်။ ယင်း၏အစာချေ အင်္ဂါ (ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ အစာကြောင်း၊ သဲအိတ်၊ အစာအိမ်၊ အူ၊ အပါအဝင်) သည် စက်ဝိုင်း ပြွန်ချောင်းကြီးထဲတွင် စက်ဝိုင်း ပြွန်ချောင်းငယ် စွပ်ထားသကဲ့သို့ တည်ရှိသည်။ ရှေ့ပိုင်းတွင် သန်မာထွားကျင်းသော ကြွက်သားများ သည် ဆန်အားရှုံ့အား အလွန်ကြီးမားသည်။ နောက်ပိုင်းသည် ပါးစပ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ သွားများမရှိချေ။ သို့ရာတွင် အလျားလိုက်အတွန့် အလိပ်များစွာရှိသည် ပါးစပ်အပြင်သို့ လှန်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤတည် ဆောက်ပုံရှိသော ပါးစပ်သည် စူးစမ်းခြင်း၊ မြေဖွခြင်းနှင့် အစား အစာ မျိုချခြင်းအတွက် အသုံးဝင်သည်။

တီကောင်များ အစာစားရာတွင် ရွေးချယ်ခြင်းမရှိ။ ပါးစပ်ကို အပြင်သို့ လှန်ထုတ်ပြီး သဲ၊ မြေဆီနှင့် ပုပ်သိုးသော သက်ရှိပစ္စည်း များကိုဝန်းရံပြီး ဟပြင်တည်းမျိုချသည်။ အစာသည် ကြွက်သားမှ ဖြစ်သော လည်ချောင်းသို့ ရောက်သောအခါ လည်ချောင်းဂလင်းမှ ထုတ်လွှတ်သော အရာများနှင့် ရောနှောကာ ဗိုစွတ်၊ စေးကပ်ပြီး၊ အစာတုံးလေးများအဖြစ် လုံးကျစ်စေသည်။ ပထမဆင့် အစာချေ ခြင်းပြုလုပ်ပြီး သဲအိတ်သို့ပို့လိုက်သည်။ သဲအိတ်တွင်ရှိသော သန် မာထွားကျင်းသည့် ကြွက်သားများ ရှုံ့ခြင်းကြောင့် ထိုသဲမြေများ သည် အလွန်နူးညံ့သောအစာ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး၊ အစာချေ ရန်အတွက် အစာအိမ်တွင်းသို့ ရောက်သွားသည်။ ဇီဝဓာတ်ပညာ



ရှင်များသည် ဤအခြင်းအရာများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် တီကောင်သည် မြေဆီကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်သည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်။


တီကောင်သည် ရှုံမြေတွင် ခေါင်းကိုမြေထဲသို့စိုက်၍မြေမျှလေ့ရှိပြီး၊ သက်ရှိပစ္စည်းများကိုအစာချေပြီး ကိုယ်ခန္ဓာမစုတ်ယူနိုင်သော သဲမြေများကို စုအိတ်မှထုတ်ပစ်သည်။ ထိုကြောင့် နွေတုတွင်မြေပြင်ပေါ်၌ စေးကပ်သော မြေတုံးကလေး မြောက်မြားစွာကို တွေ့ကြရသည်။ သဲမြေများသည် တီကောင်၏ အစာချေပြုန်ချောင်းကို မြတ်သန်းလာသောအခါ ကြမ်းတမ်းသောသဲမြေသည် နူးညံ့သွားသည်။ မြောက်သွေသော သဲမြေသည် စိုစွတ်သွားသည်သာမက ခာဘုပစ္စည်းများစွာတိုးသွားလာခြင်းကြောင့် မြေဆီကောင်းဖြစ်သွားသည်။ ကီကောင်များသည် မြေနုကို မြေလှာအပေါ်ယံသို့ ရောက်စေပြီး၊ မြေကြမ်းကို အောက်တွင် နှုံးလှမ်းစေသည်။ ဤကဲ့သို့ပြုခြင်းကြောင့် အသီးအနှံများကို အကျိုးပြုသည်။ သို့သော်လည်း သင်မေးလိမ့်မည်။ “သေးငယ်သော တီကောင်တွင် မည်မျှစွမ်းအားရှိမည်နည်း။ တီကောင်သည် မြေဆီကောင်းအောင် ပြုပြင်နိုင်စေပြီးတော့ ထိုမျှကိုယ်ခန္ဓာသေးငယ်သော ကီကောင်ကလေးများသည် ကျယ်ပြန့်လှသော မြေကွက်ကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သော် မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သနည်း”။

တီကောင်သည် အမှန်သေးငယ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းတို့၏အရေအတွက်သည် အလွန်များသည်။ ပါရဂူများ၏ စူးစမ်းတွက်ချက်မှုအရ တစ်စတုရန်းမီတာတွင် တီကောင် ၂၀၀ မှ ၈၀၀ ထိ ရှိသည်ဟုဆိုရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားအိုပေါ်ပေါက်မီ တီကောင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အချို့ရော့အရေအတွက်ပါ ညှည်လျားများပြား၍ တီကောင်ကြောင့် မြေဆီကောင်းသွားသော လယ်မြေများမှာ လက်လျှောက်ရသော အရေအတွက်သို့ ရောက်လေတော့သည်။

၁၂။ ။ မြေ? ကိုက် ခံ ရ သော အခါ အဘယ်ကြောင့် သွေးများစွာစီးကျရသနည်း

မြေ၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် တီကောင်နှင့် အနည်းငယ် ဆင်တူသည်။ သို့သော် မြေ၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် အနည်းငယ် ပြားပြီး အရှည်အတို မညီမျှချေ။ ကြီးသောမြေတုသည် ၂၀-၈၀မီတာမျှရှိပြီး သေးငယ်သောမြေတုသည် တစ်စင်တီမီတာမျှသာရှိသည်။ စေးကပ်သော အစေးရည်များ ထုတ်လွှတ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကို ပြောင်လက်စေသည်။ ရှေ့ပိုင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် စုတ်ပြွန် တခုစီရှိပြီး ခေါင်းပိုင်းရှိ စုတ်ပြွန်သည် သေးငယ်သည်။ နောက်ပိုင်းရှိစုတ်ပြွန်မှာ အရှည်ကြီးသည်။ ထိုစုတ်ပြွန်များကို စုတ်ရန်နှင့် သွားလာလှုပ်ရှားရန် အတွက် အသုံးပြုသည်။ ယင်းတို့သည် အင်း၊ ချောင်းငယ်၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအိုင်ရှိ မြက်တွင် တွယ်ကပ်နေလေ့ ရှိသည်။ တခါတရံ စိုစွတ်သော မြက်ခင်း၊ ရေနှင့်နီးကပ်သော သစ်ပင်ပေါ်၌လည်း ဝင်ရောက်ခိုအောင်းလေ့ရှိသည်။ ယင်းတို့သည်ဆောင်းအကုန် နွေအကူးတွင် စတင်၍ လှုပ်ရှားသွားလာသည်။ နွေကူးဥတုတွင် ယင်းတို့သည် ခမ်းခြောက်နေသော ရေအိုင်၏နံရံထဲတွင် ငြိမ်သက်စွာ ပုန်းအောင်းနေသည် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

မြေတုသည် သွေးစုတ်ခြင်းဖြင့် အသက်တည်စေသည်။ ခေါင်းပိုင်းရှိ စုတ်ပြွန်၏အလယ် ဗဟိုသည် ၎င်း၏ ပါးစပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် အသားပြား သုံးပြားရှိပြီး ထိုအသားပြားလေး ပေါ်တွင် သေးငယ်သော လှသွားများရှိသည်။ ထိုလှသွားများဖြင့် လူ၏ အရေခွံကို ‘Y’ ပုံသဏ္ဍာန်ခလုတ်ရာ ရစေသည်။ မြေတုသည်လူကို ကိုက်သောအခါ ထုတ်လွှတ်သော တံထွေးတွင် သွေးဟိတ်ခြင်းကို



ပယ်ချက်သော ဓာတ်တမျိုးပါဝင်သည်။ ထိုဓာတ်ကြောင့် ဒဏ်ရာ မှ စီးကုသော သွေးသည် မတိတ်တော့ချေ။ ထိုကြောင့် မြွေကိုက် ခံရသော အခါ သွေးများစွာ စီးကျခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ် မြင်းဖြင့် မြွေကို အကျိုးပြုသည်။ သွေးအဆက်မပြတ် စီးကျသော ကြောင့် မြွေသည် အဆက်မပြတ် သွေးစုတ်ယူနိုင်သည်။ သွေး ဝအောင်စုတ်ပြီး ကြာရှည်စွာ အစာမစားပါ အသက် ရှင်နေ နိုင်သည်။

မြွေသည် လူကို ကိုက်သောအခါ အလွန် အားကောင်းစွာ ဖြင့် ကပ်တွယ်နေပြီး ခက်ခဲစွာ ခွာချရသည်။ တခါတရံ မြွေကိုက် သောအခါ အသားထဲသို့ ဝင်သွားသည်ဟု ထင်ရတတ်သည်။

မြွေကိုက်ခံရသောအခါ ဆားရည်လောင်းခြင်းဖြင့် မြွေကို တိုက်ခိုက် ကွာကျစေနိုင်သည်။ ဒဏ်ရာကိုမှ ဆီးလဗားနိုက်ထရိုက် ဖျော်ရည်ဖြင့် ဆေးကြောနိုင်သည်။ ဆီးလဗားနိုက်ထရိုက် မရှိလျှင် ဒဏ်ရာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လက်ချောင်းများဖြင့် တမိနစ် နှစ်မိနစ် ခန့် နှိပ်ပေးပါ။ သွေးစီးခြင်းကို ရပ်စေနိုင်သည်။


၁၃။ ။ ဂဏန်း ကောင် များ ပူဖောင်း မှုတ် တစားလေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

စာရေးသူ ငယ်ရွယ်စဉ်က မေမေနှင့်အတူ ဈေးလိုက်သွားလေ့ ရှိသည်။ စာရေးသူ ဂရုပြုသောအချက်မှာ မေမေဂဏန်းများဝယ် သောအခါ အကာခွံမာသော ဂဏန်း၊ ပူဖောင်း မှုတ်နေသော ဂဏန်းများကိုသာ ရွေးဝယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း...။

ဂဏန်းသည် ရေတွင်နေထိုင်သော အကာခွံမာ သတ္တဝါမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ငါးကဲ့သို့ ပါးဟက်ဖြင့် အသက်ရှူသည်။ ခြားနားခြင်းမှာ ဂဏန်းကောင်၏ပါးဟက်သည် ငါးကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ

ခေါင်းပိုင်း၏ နှစ်ဖက်နှစ်ချက်တွင် ရှိသည်။ ယင်းတို့သည် ဝါးဝှမ်း ကဲ့သို့ နူးညံ့သော အရာများဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏နှစ်ဖက်တွင် ပေါက် နေသည်။ အပေါ်ယံတွင် မာကျောသည့် အကာခွံဖုံးထားသည်။ ရေတွင်ရှိနေစဉ် ကိုယ်ခန္ဓာ၏နောက်ပိုင်းမှ ရေစုတ်ယူသည်။ (ရေ တွင်ပျော်ဝင်နေသော အောက်စီဂျင်ဓာတ်သည် ပါးဟက်သို့ရောက် သည်)။ ပါးဟက်မှ ဖြတ်ကျော်ပြီး ပါးစပ်၏နှစ်ဖက်နှစ်ချက်မှ မှုတ် ထုတ်သည်။

ဂဏန်းသည် ရေတွင်ကျက်စားသော သတ္တဝါဖြစ်သော်လည်း မကြာခဏ ကုန်းပေါ်သို့တက်ပြီး အစာရှာလေ့ရှိသည်။ ရေနှင့်ခွဲခွာ သော်လည်း အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။ ဂဏန်းကောင်များ ခေနှင့် ခွဲခွာ၍ အသက်ရှင်နေနိုင်ခြင်းမှာ ပါးဟက်တွင် ရေလှောင် အား မြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လည်း ရေမှခွဲခွာသော်လည်း ရေ မှာကဲ့သို့ပင် အဆက်မပြတ် အသက်ရှူနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကုန်းပေါ်တွင် နေထိုင်သောအချိန် ကြာမြင့်သောအခါ လေကို ကြာ ရှည်စွာ ရှူထုတ်ခြင်းကြောင့် ပါးဟက်အတွင်းရှိ ရေငွေ့များသည် လေနှင့်အတူပါသွားသည်။ ထိုအခါ ပါးဟက်ခြောက်သွေ့လာပြီး အသက်ရှူ ကြပ်လာသည်။ ရေတွင်ကဲ့သို့ ပါးစပ်နှင့် ပါးဟက်ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်ခန္ဓာနောက်ပိုင်းမှ လေကို အားတန်ရှူသွင်းပြီး ပါးစပ် နှစ်ဖက်မှ ထုတ်လွှတ်သည်။ ရှူသွင်းသောလေ များခြင်း ကြောင့် ပါးဟက်နှင့်လေ တွေ့ထိသောမျက်နှာပြင် ကျယ်ပြီး ပါး ဟက်တွင်းရှိ ရေနှင့်လေ အတူမှတ်ထုတ်ရခြင်းကြောင့် ပါးစပ်တွင် ပူဖောင်း ကြာလေများလေ ဖြစ်နေသည်။ ဤကဲ့သို့ ပါးစပ်တွင် ပူဖောင်းစုနေသော ဂဏန်းသည် အသက်ရှိသေးသည်။ ထိုကြောင့် မေမေသည် ပူဖောင်းမှုတ်သည် ဂဏန်းကောင်ကို ရွေးဝယ်ခြင်းဖြစ် သည်။



၁၄။ ။ ပုစဉ်းရင်ကွဲ၊ ပုရစ်နှင့် ကျိုင်းကောင်တို့ တွင် အသံပြားမရှိပဲ အဘယ်ကြောင့် ‘သီချင်း’ ဆိုနိုင်ကြသနည်း

လူသားတို့ အသံထွက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမှာ လေသည် အားပေးပိုင်ရှိ အသံပြားကို ဖြတ်ရာတွင် တုန်ခါခြင်းကြောင့် အသံ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အသံကွဲခြင်းမှာ ပါးစပ်၊ လျှာ၊ နှုတ်ခမ်းနှင့် သွားတို့ ကွဲပြားသော ပုံသဏ္ဍာန် ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပုစဉ်းရင်ကွဲ၊ ပုရစ်နှင့် ကျိုင်းကောင်တို့တွင် အသံပြားမရှိပေ။ သို့သော်လည်း ထိုပိုးကောင်များသည် အသံပြုနိုင်သည်။ အဘယ် ကြောင့်နည်း...။ လွယ်လျက်နှင့် အဖြေရခက်သော မေးခွန်း တခုပင် ဖြစ်သည်။

ပုစဉ်းရင်ကွဲ အဖိုသည် ပိုးကောင်လောက၏ အဆိုကျော် ဖြစ် သည်။ ပုစဉ်းရင်ကွဲအမသည် အသံမပေးနိုင်။ ဂရိစေးကဗျာ တပုဒ်တွင် “ကံကောင်းလှသော ပုစဉ်းရင်ကွဲ...။ သင့်တွင်ဆွံ့ အ သော ဇနီးရှိသကဲ့သို့...”ဟူ၍ စပ်ဆိုထားသည်။ ‘ကျိုကျို’နှင့် အော်သံသည် ပုစဉ်းရင်ကွဲ၏ ဝမ်းပိုက်ပိုင်းမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုစဉ်းရင်ကွဲ၏ ဝမ်းပိုက်နှစ်ဖက်တွင် စက်ပိုင်းသဏ္ဍာန် ကြီးမားသော အသံအမြှေးပါးရှိသည်။ ထိုအမြှေးပါးရှိ ကြွက်သား များ ကျဉ်းရှည်တုန်ခါသော အခါ ပုစဉ်းရင်ကွဲ၏ အသံ ဖြစ်ပေါ် လာသည်။

ဝမ်းပိုက်ပိုင်းတွင် လေအိမ်တန်ဆာပလာရှိသည်။ အသံအ မြှေးပါးတုန်ခါသောအခါ လေအိမ်တန်ဆာပလာသည် ဟိန်းသံ


ထွက်လာပြီး ယိုင်မြှေးနှင့် ကြေးမုံအမြှေးတို့လည်း လိုက်၍ တုန် ခါခြင်းကြောင့် အသံဟိန်းထွက်လာသည်။ ပုစဉ်းရင်ကွဲ၏ အသံ အနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ခြင်းသည် အသံအမြှေးပါးအပြင်ရှိ အသံဖုံး ရှေ့ ရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဤနေရာတွင် လူ၏ပါးစပ် အကျဉ်း အကျယ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသံအနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်တူညီ သည်) သို့သော်လည်း ပုစဉ်းရင်ကွဲ၏အသံအလိုက်သည် တပြေး တည်းသာဖြစ်ပြီး လူကဲ့သို့ အသံပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ချေ။

မတူသောပိုးကောင်များတွင် အသံထွက်ရန်နေရာနှင့် အသံပေး တန်ဆာပလာ၏ တည်ဆောက်ပုံလည်း မတူကြပေ။ ပုရစ်ကောင် သည် တောင်ပံ၏ပွတ်တိုက်ခြင်းမှ အသံဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပုရစ် ကောင်၏ အသံကို သင်သေချာစွာ ဂရုပြုလေ့လာပါက ၎င်း၏ လက်ျာတောင်ပံသည် လက်ဝဲတောင်ပံပေါ် ထပ်နေသည်ကိုတွေ့ရ မည်။ ယာတောင်ပံဖြင့် ဝဲတောင်ပံကို ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့် ပုရစ် ကောင်၏ အသံဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပုရစ်ကောင် တေးသီချင်းဆို သောအခါ တောင်ပံငယ်ငယ်လေးကို အထက်သို့ ကော့ကော့တင် သည်ကို ကြည့်နူးစွာ တွေ့မြင်ရသည်။

ကျိုင်းကောင်လည်းအသံပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ပုစဉ်း ရင်ကွဲ၊ ပုရစ်တို့နှင့်မတူချေ။ ယင်း၏အသံသည် အတွင်းမြှေးခပ်နှင့် တောင်ပံတို့ ပွတ်တိုက်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တောင်ပံမဲ့သော ကျိုင်းကောင်သည် အသံမပေးနိုင်တော့ချေ။

၁၅။ ။ ပိုးကောင်များ ‘ရင်းဝား စကား’ လိုက်ပြောပုံ

မိုးရာသီ၏သန်ကောင်ယံတွင် သင့်အိမ်၏ပြု တင်းပေါက်မှ ဆိတ် ငြိမ်စွာ ဂရုစိုက်နားထောင်ပါ။ ‘ကျိုကျို’၊ ‘ကိကိ’၊ ‘တီးတီး’စသည့် ပိုးကောင်များ၏အော်သံကိုသင်ကြည့်နူးစွာကြားရမည်။ ထို့ကြောင့်



ရှေးစာဆိုတော်များသည် ထိုအသံများကို သဘာဝ၏တေးသံစုံ ဟု ချစ်ခင်၊ သာယာသော တောမြိုင် ဦးတည်သံကို ဆူညံစေသော အော်ဟစ်သံဟု ချစ်ခင် တင်စားဖွဲ့ဆိုထားခဲ့ကြသည်။

ပိုးကောင်များ အသံကုန် ဟစ်အော်ခြင်းသည် မည်သည့် အတွက်ကြောင့်ပါနည်း။ သိပ္ပံပညာရှင်များ စူးစမ်းလေ့လာချက်အရ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အချက်များကိုတွေ့ရှိရသည်။

အဓိကအချက်သည် 'ရည်းစားစကား' ပြောရန် ပိုးပန်းနေခြင်း ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ပုရစ်ရင်ကဲ့၊ ပုရစ်ကိုတွင် သဒ္ဓါရုံအင်္ဂါရှိကြ သည်။ သို့သော်လည်း အသံပေးအင်္ဂါမှာမူ ပိုးကောင်အဖိုကောင် များတွင်သာရှိသည်။ အဖိုကောင်များ အသံကုန် အော်ဟစ်သော အခါ အမကောင်လည်းကြားကြားချင်း ပြေးလိုက်လာသည်။ ဆိုဗီယက် ပိုးကောင်ပါရဂူတစ်ဦး၏ လေ့လာချက်အရဆိုသော် ပုရစ်အဖိုကောင် အသံပေးလိုက်လျှင် အမကောင်သည် အဖိုကောင်ကိုမတွေ့ မြင်ရသော်လည်း အလွန် ဝေးကွာသော နေရာမှ အော်ဟစ်နေ သော ပုရစ်ဖိုကောင်နားသို့ အရောက်လာခဲ့သည် ကိုတွေ့ရသည်။

ထိုပါရဂူ၏ တဆင့်တက်ပြီးလေ့လာချက်အရ ပုရစ်အမကောင် ၏ သဒ္ဓါရုံအင်္ဂါကို ဖြတ်ပစ်သောအခါ ပုရစ်အဖိုကောင် အာပြု အောင် အော်ဟစ်သော်လည်း ပုရစ်အမကောင်သည် မြှေးလိုက် မသွားတော့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤကြောင့် ထိုပါရဂူကြီးသည် ပိုးကောင်များ အော်ဟစ် အသံပေးခြင်းသည် 'ရည်းစားစကား' ပြောရန် ပိုးပန်းနေခြင်းဖြစ်သည် ဟု မှတ်ချက်ချသည်။

ထိုပါရဂူ၏ တင်ပြချက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များစွာတို့သည် စမ်းသပ် ချက်များစွာ ပြုလုပ်ပြန်သည်။ ဖော်ပြချက်သည် အသံချွတ်ဖြင့် ပုရစ် အဖိုကောင်၏ အသံကို ပုရစ်အမထံကို လွှင့်ပေးသည်။ ပုရစ်အမ ကောင်သည် အသံချွတ်နားကပ်လာပြီး ဖောဠုဗျာရုံဦးချိုဖြင့် အသံချွတ် မက်ကို ထိလှုပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဓာတ်ပြားဖြင့် ပုရစ်အဖိုကောင် ၏ အသံကို သွင်းပြီး အမကောင်ကို လွှင့်ပေးသောအခါ ထိုကဲ့သို့ တုန်ပြန်မှုများကို တွေ့ရပြန်သည်။ အထက်ပါ လေ့လာချက်အရ ပိုး

ကောင်များ၏ အော်ဟစ်သံသည် ချစ်ရေးဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်ပြင် ပျော်ရွှင်မြူးတူးခြင်းကိုလည်း ပြသည်။

ပိုးကောင်ပါရဂူများ၏ လေ့လာချက်အရ ကျွင်းကောင်များ ပျံ့စပ်ကြီးမားသောအသံ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအသံများသည် ရန်သူကိုကြောက်လန့်စေရန် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။


အချို့ ပိုးကောင်ငယ်များ အသံပေးခြင်းမှာ ဆာလောင်နေ၍ အမေကို အချက်ပေး ခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။

မိုးရာသီတွင် ပိုးကောင်အော်သံပေါင်းစုံ ကြားရခြင်းမှာ ထိုရာသီ သည် ချစ်ရေးဆိုကြသော ရာသီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

### ၁၆။ ။ ပိုးကောင်ငယ်များ အဘယ်ကြောင့် အရေခွံလဲရသနည်း

ပိုးကောင်များ၏ မာကျောသော အရေခွံသည် ထိုပိုးကောင် ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ငှက်လေ့လာစွာ နေနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးသည်။ သို့သော်လည်း ထို 'ကိုယ်ထည်အင်္ဂါ' သည် နုပျို နေသော ပိုးကောင်များ အတွက် ကြီးထွားခြင်းကို အဟန့် အတားဖြစ်စေသည်။ ထိုခွံမာအတွင်း၌သာ ကြီးထွားမှုပြုရလျှင် အလွန် ကျဉ်းကြပ်ပေမည်။ ခေါင်းပိုင်းတွင် ကြီးထွားရန် နေရာပင် မရှိအောင် ဖြစ်နေသည်။ ထိုကြောင့် ပိုးကောင်များ ကြီးထွားမှု မပြုလုပ်မီ ကန့်သတ်သော အချိန်တွင် ထိုခန္ဓာကိုယ်နှင့် မတော် တော့သည့် 'ကိုယ်ထည်အင်္ဂါ' ကို ချွတ်ပစ်ရသည်။ သို့မှသာ ကိုယ် ခန္ဓာများ ဆက်လက်ကြီးထွားလာနိုင်သည်။

ပိုးကောင်များ အရေခွံ တကြိမ်လဲတိုင်း ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်း ကြီးထွားလာသည်။ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသည်လည်း လိုက်၍ ပြောင်းလဲကြီးထွားလာသည်။ ပြင်ပလက္ခဏာသည်လည်း တပြိုင်နက် တည်း လိုက်၍ ပြောင်းလဲလာသည်။ ထိုကြောင့် ပိုးကောင်ငယ်





များ၏ ကြီးထွားမှု ပုံသဏ္ဍာန်အပြောင်းအလဲနှင့် အရေခွံလဲခြင်း သည် မူသေ သဘောဖြစ်နေသည်။

ပိုးကောင် အရေခွံ လဲသော အရေအတွက်သည် ပိုးကောင် မျိုးအလိုက် ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဟချို နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်၊ ဟချို ခြောက်ကြိမ်တိုင်လဲသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လေးဝါးကြိမ်လဲကြ သည်။ ဥပမာ ဟင်းရွက်ပင်ကို ဖျက်ဆီးသော လိပ်ပြာတမျိုးသည် လေးကြိမ်လဲသည်။

ပိုးကောင်များ အဘယ်ကြောင့် အရေခွံလဲရသနည်း။ သိပ္ပံ ပါရဂူများ၏ ယူဆချက်အရ။ ပိုးကောင်များ အရွယ်ရောက် သောအချိန်တွင် ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းမှ အရေခွံချွတ်ခြင်းကို နှိုးဆော် ပေးနိုင်သည့် အရည်တမျိုး ထွက်လာသည်။ ကိုအရည်၏ သတ္တိ ကြောင့် အရေခွံဟောင်းနှင့် အရေခွံသစ် ခွဲခြားလာပြီး တဖြေး ဖြေး ပါးလွှာသော အရေခွံသစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နောက်ဆုံး တွင် ပိုးကောင်သည် ဝမ်းပိုက်ပိုင်း ကြွက်သားကို ချုံ့ယုံခြင်းဖြင့် ရင်အုပ်ပိုင်း၏ သွေးဖိအားကို မြင့်လာစေသည်။ ထိုအခါ ခါးသည် ခုံးလာပြီး အခန္ဓာဟောင်းသည် ခေါင်းနှင့် ရင်အုပ်ပိုင်းတလျှောက် ကွာကွဲလာသည်။ ရေတွင်ကျက်စားသော ပိုးကောင်များသည် ရေ၊ လေကိုစုတ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖောင်းကြွစေသည်။ ထိုအခါ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ နှုတ်ပြောင်းသော နေအရာမှ အက်ကွဲပြီး လှုပ်ရှား၍ အပြင် သို့ တိုးထွက်လာသည်။ အရောင်အမျိုးမျိုးလည်း ဖြစ်ပေါ်လာကြ လေသည်။

၁၇။ ။ ခြကောင်များ အဘယ်ကြောင့် အ ဆောက် အဦများကို ဖျက်ဆီးရသနည်း

အပူပိုင်းဒေသရှိ နေအိမ်များ၊ လှေများ၊ မှန်ဘီရိုများ၊ စာအုပ် များ စသည်တို့သည် များသောအားဖြင့် ခြကိုက်ခံရလေ့ ရှိကြသည်။ ခြကောင်ကြောင့် ပင်လယ်တွင် လှေမှောက်ခဲ့ရသည် ပုံဝတ္ထုကို


ငယ်ရွယ်စဉ်က မတ်စာအုပ်တွင် သင်ကြားခဲ့ဖူးသည်။ ခြကောင် ကိုက်စားထားသော အရာဝတ္ထုများသည် အဆွေးနှင့်အပေါက်များ ကျန်ရစ်လေ့ရှိသည်။

သင်မေးလိမ့်မည် ။ ခြကောင်သည် ဤသစ်သားများ၊ စက္ကူ များကို အဘယ်ကြောင့် ကိုက်စားရသနည်း။ ဤအစာများစားခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်နေနိုင်သလော ။

သစ်သားတွင် အော်ဂဲနစ်ဗြင်ပေါင်းများ ပါဝင်သည်။ အဓိက ပါဝင်သောပစ္စည်းမှ အမျှင်ဓာတ်နှင့် သစ်သားဓာတ် ဖြစ်သည်။ အမျှင်ဓာတ်သည် ဝလူးကို သကြားဓာတ်ပါသော ဗြင်ပေါင်းဖြစ် သည်။ အကယ်၍ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် သစ်သားပြားများကို ပေါင်း ဟပ်ပါက အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝသည့်ဝက်စာကိုရလိမ့်မည်။ ပေါင်း တင်ခွဲထုတ်ခြင်း မပြုသေးလျှင် ယင်းတွင် အာဟာရဓာတ် မည်မျှပင် ပါဝင်နေစေကာမူ အစာချေစုတ်ယူရန် မတတ်နိုင်ပေ။

ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ရာအချက်မှာ ခြကောင်၏ အူထဲတွင် အလွန် သေးငယ်သည့်အန်နိုစားသတ္တဝါ တမျိုးရှိသည်။ ယင်းကို ခြကောင် ၏ကပ်ပါး'ဟု ခေါ်သည်။ ထိုကပ်ပါးကောင်သည် ခြကောင်စား သွားသောအခါ သစ်သားအမျှင်များကို နူးညံ့နေအောင်ဝါးကိုက် ပေးပြီး ခြကောင်ကို အစာချေစုတ်ယူစေသည်။ ယင်းကပ်ပါးငယ် သည်လည်း ထိုအာဟာရအနည်းငယ် စုတ်ယူပြီး အသက်ရှင်နေထိုင် သည်။ ခြကောင်နှင့်ကပ်ပါးကောင်တို့ ဤသို့ "အညှစ်မညှစ်" နေထိုင် ခြင်းကြောင့် ခြကောင်အား သစ်သားဖျက်ဆီးရာ 'ပါရဂူဘွဲ့' ရစေ လေသည်။

သာမန် အဆောက်အဦများ၏ ယက်မနှင့် တိုင်များကို သစ် သားဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားလေ့ ရှိသည်။ အကယ်၍ မိုးရေယိုပြီး ထိုယက်မနှင့် တိုင်ပေါ်စီးဆင်းပါက ထိုနေရာသည် ခြကောင်များ ကျက်စားရာ ဒေသဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ ခြကောင်များ တမျိုးလုံး တဆွေလုံး ထိုနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြလိမ့်မည်။ ကာလကြာ သော် ထိုအိမ်ကြီး ပြိုဆင်းရတော့သည်။



အချို့ ခြကောင်ကို အထူးလေ့လာသည့် ပါရဂူများသည် ခြကောင်၏ ထိအခြင်းအရာကို အသုံးပြုပြီး ခြကောင်ကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပစ်သည်။

### ၁၈။ ။ ကျိုင်းကောင်များ အဘယ်ကြောင့် အုပ်စုလိုက် သောင်းကျန်းရသနည်း

ကျိုင်းကောင်များ အုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှားခြင်းမှာ အလွန် အံ့ဩစွယ်ကောင်းသည်။ ပျံသန်းနေစဉ်၎င်း၊ မြေပေါ်တွင် အနားယူနေစဉ်၎င်း အုပ်စုမကွဲဘဲ နေထိုင်စားသောက်လေ့ ရှိသည်။ အုပ်စုကွဲထွက်သော ကျိုင်းကောင်များကို မြင်ရခဲသည်။ ထို့ကြောင့် ကျိုင်းကောင်များကို အုပ်သင်းဖွဲ့ နေထိုင်သော မိုးကောင်ဟု ခေါ်သည်။

ကျိုင်းကောင်များ ဤကဲ့သို့ အုပ်စုလိုက် နေထိုင်ခြင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နေ့စဉ် ဘဝအလေ့အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဥအမျိုးပွားသော လေ့မှ အောင်မြင်ပါအံ့။ ကျိုင်းကောင်အသေသည် ဥချရန် နေရာများကို စေ့စပ်စွာ ရွေးချယ်လေ့ ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နှာကော့ထော် မြေဆီလွှား၊ အပူချိန်အသင့်တင့်နှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကူးသော နေရာများသည် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော လယ်ကွင်းပြင်ထက် အထက်ပါလိုအပ်ချက်နှင့် ပြည့်စုံနေသော နေရာမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ကျိုင်းကောင်များသည် မကျယ်ဝန်းလှသော နေရာဒေသတစ်ခုတွင် စုပြုံပြီး ဥအုရခြင်းကြောင့် ဥအတုံးအခဲများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ (ဥတစ်ခုလျှင် ၅၅ လုံးမှ ၁၁၅ လုံးထိရှိသည်) ထိုဒေသတွင် အပူချိန် ကွာခြားမှု နည်းခြင်းကြောင့် ထိုဥများသည် တပြိုင်တည်း ပေါက်စွားသည်။ ထိုကျိုင်းကောင် မျိုးငယ်များသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အုပ်စုလိုက် ကြီးပြင်းခြင်း၊ ပိုင်းပင်းကူညီခြင်း၊ အတူ

တကွ နေထိုင်ကျက်စားခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ကြီးရင့်လာသော အခါ၌လည်း ထိုငယ်ရွယ်စဉ်က လေ့များ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်လေတော့သည်။

ကျိုင်းကောင်များ အုပ်စုလိုက် သောင်းကျန်းနိုင်ခြင်းမှာ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း တည်ဆောက်ပုံ အခြေအနေကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့၏ ကိုယ်အပူချိန်သည် သွေးနွေးသတ္တဝါကဲ့သို့ မတုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အပူချိန်နှင့် မကွာခြားလှပေ။ သို့သော်လည်း အနည်းငယ်မြင့်သည် ကိုယ်အပူချိန် ရှိမှသာ အတွင်းကိုယ်အင်္ဂါ လှုပ်ရှားမှုကို အထောက်အကူ ပေးနိုင်သည်။

ထိုလိုအပ်ချက်ကြောင့် ကျိုင်းကောင်များသည် အုပ်စုလိုက် တကောင်နှင့် တကောင် ပူးပူးတက်ကပ် နေခြင်းဖြင့် ကိုယ်အပူချိန် မလျော့သွားအောင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အခြားအချက်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အပူချိန်များ အဆက်မပြတ် ရရှိခြင်းဖြင့် ကိုယ်အင်္ဂါ လှုပ်ရှားမှုကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် အုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှား၍ နေကို ဦးတည်ပြီး ပျံသန်းလေ့ ရှိသည်။

အုပ်စုလိုက်လှုပ်ရှားသော ကျိုင်းကောင်တွင် တူညီသော ထူးခြားသည့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ တည်ဆောက်ပုံ ရှိခြင်းကြောင့် တကောင်သော ကျိုင်းကောင် ကောင်းကင်တွင် ပျံဝံ့နေသည်ကို မြင်ရလျှင် ကျန်ကျိုင်းကောင်များလည်း လိုက်၍ ပျံဝံ့လေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျိုင်းကောင်များ၏ အုပ်စုသည် လျင်မြန်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်ပြင် ပျံလေလေ အုပ်စုကြီးထွားလာလေလေ ဖြစ်သည်။



၁၉။ ။ ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များ အမြဲ စစ်တိုက်လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

နွေရာသီတွင် သစ်ပင်၌ အရွယ်အဖုံဖုံသော ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များ ကူးလူးသွားလာခြင်း၊ ဖက်ရွက်များ၊ ပိုးကောင်သေများကို သယ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ တခါတရံ ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံမိကြသောအခါ အုပ်စုလိုက် ကိုက်ဖြတ်သတ်ပုတ်လေ့ ရှိသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များ ဘာကြောင့်စစ်တိုက်ရသနည်း -။ နာမည်ကျော် “အသက်ရှင်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲ” စာအုပ်တွင် ဤသို့ ဆိုထားသည်။ “သဘာဝတွင်း၌ သက်ရှိများတို့သည် အစား၊ ရေငွေ့၊ နေရောင်ခြည်၊ နေထိုင်ရန်ဒေသနှင့် မျိုးပွားခြင်း၊ ရရန်အတွက် အကျိုးမပေးသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ ရန်သူအန္တရာယ်၊ ပြိုင်ဖက်များနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ရလေ့ ရှိသည်။ တိုက်ပွဲ၏နိဂုံးတွင် အများအပြားသေဆုံးရလေ့ ရှိသည်။” ထိုစာအုပ်တွင် အသက်ရှင်ရေးတိုက်ပွဲကို သုံးမျိုး ခွဲခြားထားသည်။ သက်ရှိများနှင့် သဘာဝတို့၏ တိုက်ပွဲ၊ မျိုးတူချင်းတိုက်ပွဲ၊ မျိုးမတူချင်းတိုက်ပွဲတို့ဖြစ်သည်။

အချို့ပိုးကောင်ပါရဂူများသည် ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များ၏ တိုက်ပွဲကို အစာလှစားခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုက်ပွဲဟု ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးတူချင်းတိုက်ပွဲ သီအိုရီဖြင့် ရှင်းသည်။

များစွာသော ပိုးကောင်ပါရဂူများသည် ထိုတိုက်ပွဲကို မျိုးတူချင်းတိုက်ပွဲဟု မယူဆဘဲ ဓါတုတိုးပြန်မှု တမျိုးကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။


ထိုယူဆချက် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြရန်အတွက် ပါရဂူများက အောက်ပါစမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ကြသည်။ မတူသောသိုက်မှ

ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်နှစ်ကောင်ကို အတူတကွထားသောအခါ ယင်းတို့၏ ဖောဋ္ဌဗျာရုံ ဦးချိုမျှင်း ထိသောအခါ ထသတ်ကြလေတော့သည်။ သိုက်တူပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များ အတူတကွထားသောအခါ ယင်းတို့တွေ့ဆုံသော်လည်း ကိုက်ဖြတ် သတ်ပုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ကြချေ။ အပြန်အလှန်ပင် အစာကွေးကြသည်။

အထက်ပါအခြင်းအရာကို ပိုးကောင်ပါရဂူများက အောက်ပါအတိုင်း ရှင်လင်းသည်။ မတူသောသိုက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်ကိုယ်ပေါ်တွင် ထူးခြားသော “သိုက်နံ့” ရှိသည်။ ထို “သိုက်နံ့” သည် အသိုက်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်း၊ သိုလှောင်ထားသောအစာနှင့် ကိုယ်ပေါ်မှ စိခွဲထွက်အရာ တို့ ပေါ်တွင်မှတည်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တိုင်းတွင် “သိုက်နံ့” ကို ခွဲခြားနိုင်သည့် စွမ်းအင်ရှိသည်။ မိမိသိုက်ဝင်မဟုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များကို တွေ့ဆုံသောအခါ ကိုက်ကြလေတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ စစ်ပွဲဝယ်လေးမှ စစ်ပွဲကြီးသို့တိုင် ကျယ်ပြန့်လေ့ ရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစွယ် ကောင်းသောအချက်မှာ တိုက်ပွဲအဝင်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များကို ရေဖြင့်လောင်းပြီး ထပ်မံတွေ့ဆုံပေးသောအခါ တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ပဲ အိမ်ခြေရရ နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အကယ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်ဘကောင်၏ကိုယ်ပေါ်တွင် ရေမွှေးဆွတ်ပေးပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်သည် အိမ်မပြန်နိုင်တော့ချေ။ သိုက်တူပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များသည် ယင်းကို ရန်သူကဲ့သို့ဆက်ဆံပြီး မောင်းထုတ်ကြသည်။

အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်များ အုပ်စုလိုက် တိုက်ပွဲဆင်ရာတွင် အုပ်စုကြီးခြင်း၊ ငယ်ခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည် ဟု ဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် မျိုးမတူသောပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်အုပ် တွေ့ဆုံကြသောအခါ ချက်ခြင်းထက်ကြဲတော့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ် တကောင်စီ တွေ့ဆုံလျှင် ရန်ပွဲဖြစ်ရန် အခွင့်အရေးနည်းသည်။



၂၀။ ။ပျကောင်ပေါများသည့်နေရာတွင်ပုရွက်ဆိတ်ပေါများလေ့ရှိသည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း

မန္တလေးကားလတွင် လယ်ယာသီးနှံများပေါ်၌ ပျကောင်များစွာ အုံနေကြသည်။ ထိုပျကောင် စုအုံနေသော လယ်ယာသီးနှံများပေါ်တွင် ပုရွက်ဆိတ်များကို ဧည့်သည်တော်အဖြစ် အမြဲ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ တလမ်းလုံး သွားလာ လှုပ်ရှားနေကြသည်။ စည်ကားလှလေစွာ ထိုအခြေအရာကို များစွာသော သူတို့က ပုရွက်ဆိတ်ပိုးကောင်ကို စားနေသည်။ 'အစာ'သယ်ဆောင်နေသည်ဟု ယူဆကြသည်။ အမှန်မှာ ပုရွက်ဆိတ်သည် 'နှား ထိန်းကျောင်း' နေခြင်းသာဖြစ်သည်။

အကယ်၍ သင်သေချာ ဝရုတစိုက် လေ့လာပါက ပုရွက်ဆိတ်သည် မကြာခဏဆိုသလို ပျကောင်၏နောက်ပိုင်းကို ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ ဦးချိုဖြင့် ထိုးနှက်နေသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ ယင်းတို့သည် 'အညမည' သဘောဖြင့် နေထိုင်အသက်ရှင်ကြသည်။ သေးငယ်သော ပျကောင်သည် ပုရွက်ဆိတ်၏ ဖြေးညှင်းစွာ ထိုးနှက်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ တင်ပေးကို ကော့တင်ပြီး 'ပျားရည်နှင်း' ဟူသည့် ချိုမွှေးသော အရသာ ရှိသည့် အရာကို စိန်ထုတ်သည်။ ထိုအရာကို ပုရွက်ဆိတ်လည်း တဝကြီးအားမနာစတမ်း သုံးဆောင်လေသည်။ ထိုကြောင့် ပျကောင်ပေါများသော နေရာတွင် ပုရွက်ဆိတ်ပေါများလေ့ရှိသည်။

အကယ်၍ ပျကောင်သည် ရန်သူများ (ဥပမာ ယင်ကောင်၊ ပုခင်းကောင် စသည့်ပိုးကောင်များ) နှင့် တွေ့ဆုံသောအခါ ပုရွက်ဆိတ်က ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးသည်။ ထိုကြောင့် ပျကောင်ပေါ

များသည့် နေရာတွင် ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ ပုရွက်ဆိတ် အစောင့်တပ်များ ချထားသည်။

အခြား အကြောင်းတချက်မှာ ပျကောင်များ ကျက်စားသည့် ဒေသတွင် အစာ ရှားပါးလာပါက ပုရွက်ဆိတ်သည် ပျကောင်ကို အစာပေါများရာ ဒေသသို့ သယ်ဆောင်ပို့ပေးသည်။ ဤသည်မှာလည်း ပုရွက်ဆိတ်ပေါများခြင်း အကြောင်းတရပ်ဖြစ်သည်။


ပျကောင်သည် ပုရွက်ဆိတ်ကို 'ပျားရည်နှင်း'ပေးသည့် အတွက် တဦးနှင့်တဦး ပို၍ခင်မင်နေကြသည်။ ပို၍စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အချက်မှာ ပျကောင် အထားသည့် ဥကို ဆောင်းကူးရန် အတွက် ပုရွက်ဆိတ်က မိမိ၏ အိမ်သို့ သယ်ဆောင်ပြီး ဆောင်းကူးရန် ကာကွယ်ပေးသည်။ ဆောင်းကူးဥများ မစွတ်စိုရန် နေသာသောနေ့တွင် အပြင်ဖက်သို့ ထုတ်ပြီး နေလှန်းသည်။ နေလှန်းပြီး မြေအောက်အိမ်သို့ ပြန်သယ်ဆောင်သွားသည်။ နွေကူးရာသီတွင် ပျကောင်ငယ်များ ပေါက်ဖွားသောအခါ ပုရွက်ဆိတ်သည် ထိုပျကောင်ငယ်ကို ယင်းတို့နှစ်သက်သည့် သစ်ပင်နားသို့ သွားချပေးပြန်သည်။

ပျကောင်နှင့် ပုရွက်ဆိတ်များ ဤသို့ 'အညမည' သဘောဖြင့် နေထိုင်ပုံသည် တိရစ္ဆာန်လောကတွင် တွေ့ရခဲသည်။

ထိုကြောင့် ပျကောင်ကို နှိမ်နှင်းလိုလျှင် ယင်းနှင့် ပုရွက်ဆိတ်တို့ကို အဆက်ပြတ်အောင် ပြုလုပ်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မည်။

မှတ်ချက်။

ပျကောင်သည် အစားကြီးသော ပိုးကောင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် နေ့စဉ် မပြတ် အပင်များမှ ဝတ်ရည်ကို စုတ်ယူသည်။ ထိုစုတ်ယူသော ဝတ်ရည်ကို အချို့ တဝက်အာဟာရအဖြစ် ခုတ်ယူပြီး ကျန်အပိုင်းများကို စအိုမှ ထုတ်ပစ်သည်။ ထိုစအိုမှ ထုတ်လိုက်သော အရာတွင် သကြားဓာတ် ပါသောကြောင့် 'ပျားရည်နှင်း'ဟု ခေါ်သည်။



၂၁။ ။ အဘယ်ကြောင့် ငါးများ ရေထဲတွင် မလှုပ်ရှားပဲ ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေနိုင်သနည်း

ရွှေငါးကန်ရွှေတွင် သင်ရပ်ပြီး ဂရုစိုက်ကြည့်ရှုလျှင် ရေထဲတွင် မလှုပ်ရှားပဲ ငြိမ်သက်စွာရပ်နေသည့် ငါးများကိုတွေ့ရမည်။ ထိုအမှုအယာများသည် လွန်စွာ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည်။

ငါးများသည် လေထက် သိပ်သည်းဆ များစွာကြီးသော ရေတွင် နေထိုင်ကျက်စားသည်။ ငါး၏ကျောပိုင်း ကျောရိုး၏ အောက်တွင် လေပြည့်ဝနေသည့် အဖြူရောင်အိတ်ရှည်တခုရှိသည်။ ထိုအိတ်ရှည်မှာ ငါးစည်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ငါးများသည် ထိုငါးစည်ဖောင်းကို အသုံးပြုပြီးရေအတိတ်အဝက်တွင် လေထုတ်ခြင်း၊ ချွဲလွင်းခြင်း စသည်တို့ကို ကိုယ်ခန္ဓာ၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ရေ၏သိပ်သည်းဆကို ညီမျှနီးပါးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

၎င်းပြင် ငါးတွင် ငါးဆူးတောင် ဟူသည့် ကျောပိုင်းရှိအရာသည် လေ၏တက်မကွဲသို့ ငါးကိုထိန်းထားသည်။ ပါရဂူများ၏ စမ်းသပ်ချက်အရ ငါးဆူးတောင် ဖြတ်ထားသောငါးကို ရေသို့ပြန်ချပြီးကြည့်ရှုရ အံ့ဩစွာ ဖိမိကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ပဲ ဘယ်ယိုင်ညာယိုင်ဖြစ်နေသည်။

ငါးများ ရေတွင်မလှုပ်ရှားပဲ ငြိမ်သက်စွာနေနိုင်ခြင်းမှာ ငါး၏ ကိုယ်ခန္ဓာရွှေပိုင်း ဝမ်းမျက်နှာပြင်ရှိ ရင်ဆူးတောင်တစ်ခုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ငါးများသည် ပါးဟက်မှလေရှူသွင်းပြီး ပါးဟက်ဖုံးမှ ရေအဖြစ်မှုတ်ထုတ်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့် ငါးကိုရွေ့သို့ တွန်းပေးခြင်းနှင့် တူသည်။ ထို့အားကို ချေဖျက်စေရန် ယင်း၏ ရင်ဆူးတောင်ကို လျှင်မြန်စွာ တချက်နှစ်ချက် ခတ်ပေးရသည်။ သို့မှသာ ရွှေတွင် ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေနိုင်မည်။


၂၂။ ။ ငါးများ တခါတရံ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ခုန်တက်လေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

ငါးများ အဘယ်ကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ခုန်တက်လေ့ရှိသနည်း.....

ငါးများရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ခုန်တက်ခြင်းမှာ ရေထဲတွင် လေလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ခုန်တက်ပြီး လေထဲရှိ အောက်စီဂျင်ဓာတ်ကို စုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခြင်းအရာကို တံငါသည်များက ငါး“ခေါင်းဖော်ခြင်း”ဟု ခေါ်သည်။

ငါးများတွင် ဤအခြင်းအရာများ ဆောင်းတွင်း ညနေခင်းနှင့် နွေရာသီ လွှပ်စီးလက်ပြီးသောအခါများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များ၏အဆိုအရ အစိမ်းရောင် သစ်ပင်များသည် နေရောင်ခြည်အောက်တွင်သာ “ဖိုတိုစင်သစ်”ပြုလုပ်သည်။ ထိုအခါမှသာ အောက်စီဂျင် ဓာတ်ထုတ်လွှတ်သည်။ ညဖက်တွင် အောက်စီဂျင်ဓာတ် စုတ်ယူသည်။ ရေထဲတွင်ပေါက်နေသော အပင်များသည်လည်း ညတွင်ရေထဲမှ အောက်စီဂျင်ဓာတ်စုတ်ယူသည်။ ထိုကြောင့်ရေထဲတွင် အောက်စီဂျင်ဓာတ်လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့် ငါးများသည် ရေပေါ်သို့ ခုန်တက်ပြီး အသက်ရှူရသည်။

ဆောင်းရာသီတွင် ရေတွင်းရှိ အောက်စီဂျင်ပစ္စည်းများ အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရေတွင်းရှိ အောက်စီဂျင် များစွာကို သုံးပစ်သည်။ အခြားတချက်မှာ တခါတရံငါးများအလွန်မြတ်ကြပ်နေခြင်းကြောင့် ရေရှိ အောက်စီဂျင်သည် ငါးများ ကြားရှည်စွာ အသုံးပြုရန် မလုံလောက်ဖြစ်လာသည်။ တဖန်မြက်ခင်းပြင် [ သို့ ]



တောင်ပေါ်မှ သတ္တုဓာတ်နှင့် ကန်ခြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည့် ရေများ စီးဝင်ခြင်းကြောင့် အောက်စီဂျင်ဓာတ်လျော့နည်းသွားသည်။

အကယ်၍ ထိုအချိန်အခါတွင် ရေကန်ထဲသို့ ရေသွင်းခြင်းများ မပြုလုပ်ခဲ့လျှင် “ခေါင်းဖော်ခြင်း” ပုံနှိပ် ပြင်းထန်လာလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင် ငါးများ သေကြေပျက်စီးလိမ့်မည်။ နွေရာသီတွင် လှုပ်ရှားလက် ရိုးရွာပြီးသောအခါ ရေမျက်နှာပြင်၏ အပူချိန်ကျဆင်းသွားသည်။ ရေကန်အောက်ရှိ ရေ၏အပူချိန်မှာ ပြင်းပြီဖြစ်နေသည်။ ရေပူသည် အပေါ်သို့တက်သည်။ ထိုအခါရေကန်အောက်ရှိ ပုပ်သိုးသေတ္တာများပါ ရေပေါ်သို့ အတူအတန်းလာသည်။ ပုပ်သိုးသေတ္တာများသည် အောက်စီဂျင်ဓာတ် များစွာစုတ်ပြီး ပိုနှိပ်ပုပ်သွားသည်။ တနေ့ ကာမုန်နိတ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်သည်။ အကယ်၍ ဤသို့ဖြစ်လာ အရေးမယူလျှင် ငါးများ ‘ခေါင်းဖော်ခြင်း’ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ဤစလျှင် ငါးများသေကုန်လိမ့်မည်။

၂၃။ ။ ငါးသေဆုံးသောအခါ အဘယ်ကြောင့် ဝမ်းပိုက်ပိုင်းသည် အပေါ်သို့ လန်နေရသနည်း

ငါးများ အသက်ရှင်နေစဉ် ရေထဲတွင် ဖန်ရာအတိအကျ ယူထွက်နိုင်သည်။ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပေါ်ခြင်းမရှိ။ ရေအောက်သို့လည်း မြုပ်ခြင်းမရှိ။ ငါးများစွာတို့၏ ကိုယ်ထဲတွင် ကိုယ်အလေးခွန်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော အင်္ဂါရှိသည်။ ယင်းမှာ ငါးစည်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ရေအတိမ်အနက် မတူသော နေရာတွင် လေထုတ်ခြင်း၊ လေစုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးကိုယ်၏ အလေးဆနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရေ၏အလေးဆတို့ တူညီအောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့် ငါးသည် မည်သည့်ရေလွှာတွင် မဆို လွယ်ကူစွာ နေထိုင်နိုင်သည်။

ငါးတကောင်သည် ရေနက်မှရေတိမ်သို့ ကူးသွားသောအခါ

ငါးသေစမ်းပိုက် အဘကြောင့် အပေါ်လန်ရသနည်း ၄၅

ရေ၏ဖိအား လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့် ငါးစည်ဖောင်းပွား၍ လေငွေ့သည် ပူလာပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျော့သွားသည်။ ထိုအခြေအနေတွင်အပေါ်တက်ရန်ရှိသည်။ အပေါ်မတက်ရန် (ဝါ) ထိုအခြေအနေကိုချေဖျက်ရန် ငါးစည်ဖောင်းတွင်းမှ လေထုအနည်းငယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။ အကယ်၍ ငါးသည် ရေတိမ်မှရေနက်သို့ ကူးသွားလျှင် ကိုယ်အလေးဆ တိုးလာမည်။ ထိုအခါ စည်ဖောင်းထဲသို့ လေစုတ်သွင်းရမည်။ ဤသို့ပြုလုပ်မှသာ ရေအလွှာတွင် ရပ်နေနိုင်မည်။ ငါးသေပြီးသောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံး ညီမျှရန် ဘိန်းပေးသည့် အင်အားမရှိတော့ချေ။ ငါးစည်ဖောင်းလည်း လေထု ဖြည့်နေ လေသည်။ ကိုယ်အလေးဆ လျော့နည်းနေသည်။ ငါးကျောပိုင်းသည် များသောအားဖြင့် ကျောရိုးနှင့် ကြွက်သား များသောနေရာများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလေးဆများသည်။ ဝမ်းပိုက်ပိုင်းတွင် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ (ဥပမာ- အစာချောအင်္ဂါ၊ အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါ) ရှိ၍ ဟာတွက် ပိုများခြင်းကြောင့် အလေးဆ ဖယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါးသေဆုံးသောအခါ အလေးဆ ဖယ်သည့် ဝမ်းပိုက်ပိုင်းသည် အပေါ်သို့လန်နေသည်။

သို့သော်လည်း ငါးပေါ်ရှင်၊ ငါးမျက်ကွင်း စသည့်ငါးတို့သည် ငါးစည်ဖောင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကိုယ်ထည်သည် ရေထက်လေးသည်။ ထိုငါးများ ရေထဲနေရာတွင် ရပ်တည်နေရန် ငါးဆူးပောင်ကို အမြဲလှုပ်ခတ်ပေးရသည်။ သို့မှသာ ကိုယ်ထည် အောက်သို့ မြုပ်မဆင်းပေ။ ထိုငါးများ သေဆုံးသောအခါ ရေအောက်သို့ မြုပ်ဆင်းသွားလေသည်။



၂၄။ ။ ငါးအကြေးကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ငါး၏သက်တမ်းကို သိနိုင်သနည်း

ငါးအကြေးအငယ် အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ငါး၏ သက်တမ်းကို သိရှိရန် ခေက်ခဲလှပေ။ ငါး၏ကိုယ်ပေါ်မှ အကြေးပြားတပြားကိုယူပြီး သေချာစွာ ကြည့်ရှုလေ့လာပါက သိရှိနိုင်သည်။

အဘယ်ကြောင့် ငါးအကြေးကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ငါး၏သက်တမ်းကို သိနိုင်သနည်း။

ငါးပေါ်ရတနာ၏ ဘေးပြောချက်အရ ငါး၏ အသက်စသော နှစ်တွင် တကိုယ်လုံး အကြေးပြားနှင့် ပြည့်နေလေပြီ။ အကြေးပြားသည် အပါးပြား ကြီးငယ်တို့ဖြင့် စုပေါင်းတည်ဆောက် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြေးပြား၏ အလယ်ပတ်သည် တူပြီး အနားများသည် ပါးနေသည်။ အပေါ်ဆုံးအထပ်သည် အရှည် အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သက်တမ်းအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အောက်ဆုံးအထပ်သည် အကျိုးဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သက်တမ်း အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အကြေးပြား ပေါက်ဖွားလာသည်နှင့် ယင်း၏ မှက်နှာပြင်တွင် အပါးပြားတထပ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ငါး၏ သက်တမ်း ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အပါးပြား အရေအတွက်လည်း အပေါက်ပေါက် တိုးလာ သည်။

တနှစ်အတွင်း ရာသီဥတု၏ ကြီးထွားနှုန်း မတူညီကြချေ။ သို့သော်လည်း မန္တလေးနှင့် နေရာသီတွင် ကြီးထွားနှုန်း ပြန်သည်။ မိုးရာသီတွင် မနားသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ကြီးထွားခြင်း ရှိလေ့ရှိသည်။ ဆောင်းနှင့် နွေကူးရာသီကမူ ပြန်လည် ကြီးထွားသည်။ အကြေးပြားသည်လည်း ဤကဲ့သို့ပင် နွေကူးရာသီ

နှင့် နွေရာသီတွင် ကြီးထွားသော အပိုင်းသည် ကျယ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ကြီးထွားသော အပိုင်းသည် ကျဉ်းသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ကြီးထွားမှု ရပ်တန့်နေသည်။ အကျဉ်းအကျယ် မတူညီသော အပါးပြားများသည် ဗဟိုချက်ကိုပက်ပြီး စီရီနေသည်။ ထိုဖြစ်ပေါ်လာသော အရစ်ကို “သက်တမ်းရစ်” ဟုခေါ်သည်။ ‘သက်တမ်းရစ်’ ၏ အရေအတွက်သည် ငါး၏သက်တမ်းနှင့်တူညီသည်။


နွေကူးရာသီနှင့် နွေရာသီတွင် ကြီးထွားသည့် ကျယ်ပြန့်သော အပါးပြားများသည် ကျွဲစွာ စီရီနေပြီး မိုးရာသီတွင် ကြီးထွားသည့် ကျဉ်းသော အပါးပြားသည် စိပ်စွာ စီရီနေသည်။ ယင်းနှစ်ခုကြားတွင် နယ်နိမိတ်ကြောင်း ထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်နေသည်။ ထိုနယ်နိမိတ် လမ်းကြောင်းသည် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်ကို ခွဲခြားထားသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို ‘နှစ်တမ်း’ ဟုခေါ်သည်။ ‘နှစ်တမ်း’ များသော ငါးသည် အသက်ကြီးပြီး ‘နှစ်တမ်း’ နည်းသော ငါးသည် အသက်ငယ်သည်။

ထို့ကြောင့် ငါးအကြေးကိုကြည့်ပြီး ‘နှစ်တမ်း’ ကို ရေတွက်ခြင်းဖြင့် ငါး၏သက်တမ်းကို သိရှိနိုင်သည်။

ငါးသက်တမ်းကို ကြည့်တတ်ခြင်းသည် ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းတွင် များစွာအသုံးဝင်သည်။ သက်ကြီးများကို ဦးစွာဖမ်းစားနိုင်သည်။ သို့မှသာ စီးပွားရေးတွက် ကိန်းနှင့် ကိုက်ညီမည်။

၂၅။ ။ ငါးပူတင်းကို စားလျှင် အဘယ်ကြောင့် အဆိပ်တောက်တတ်သနည်း

‘ငါးပူတင်းကို အသက်နှင့်လဲစားမည်’။ ဤစကားပုံသည် ဂျပန်အမျိုးသားစကားပုံတခုဖြစ်သည်။ ဤစကားပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ငါးပူတင်းအသားသည် အလွန်အရသာရှိသော ငါးသားဖြစ်ကြောင်း



ထင်ရှားသည်။ အသက်နှင့် လဲစားထိုက်အောင် အရသာရှိသည် ဟု ဆိုသည်။

ငါးပုတင်းသားသည် အရသာမွှေးကြိုင်သော်လည်း စားမိသူ အချို့မှာ အဆိပ်တောက်ပြီး 'သေရွာသို့ရောက်ရသည်။ ဤကဲ့သို့ ငါးပုတင်းစား၍ အဆိပ်သင့်သောသူများရှိခြင်းကြောင့် ငါးပုတင်း ၏ အသားသည် အဆိပ်ရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။ အမှန်အား မြှင့် ငါးပုတင်း၏အစိတ်အပိုင်းတိုင်း အဆိပ်မရှိချေ။ အဆိပ်သည် များသောအားဖြင့် ယင်း၏ 'မျိုးပွားဂလင်း' (သုက်အိမ်၊ ဥအိမ် နှင့် ဥအပါအဝင်) နှင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ (အသည်း၊ အူ) စသည့်အပိုင်းတွင် ဘဲသိရှိသည်။ ယင်းအစိတ်အပိုင်း၏အစည်းပုံတွင် အပူချိန်ခံနိုင်သော၊ အချဉ်ဓာတ်ခံနိုင်သော၊ သို့သော်လည်း ဗေ များက လွယ်ကူစွာ ဖျက်ဆီးနိုင်သော 'ငါးပုတင်းအဆိပ်ဓာတ်' အရာဝတ္ထုရှိသည်။ ငါးပုတင်းအမျိုးအစားနှင့် အစိတ်အပိုင်းတို့ တွဲပြားခြားနားခြင်းကြောင့် အဆိပ်ဓာတ်လည်း တွဲပြားခြားနား သည်။ ရာသီအသက် အဆိပ်ဓာတ် အပြင်းအထန် ပြောင်းလဲမှု ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဥဆိပ်ခံမှုမရှိသော ဆောင့်ရာသီနှင့် နွေကူးရာသီကြားတွင် အဆိပ်ဓာတ်အပြင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုအဆိပ် ဓာတ်ကို လူများစားမိသောအခါ အကြောများ ကျပ်သုံလာပြီး အန်ခြင်း၊ ခြေလက်အေးစက်နေခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် နှလုံးခုန် ခြင်းနှင့် အသက်ရှူခြင်း လုံးဝပိတ်သွားပြီး သေဆုံးပေတော့သည်။ ငါးပုတင်းသေသောအချိန် ကြာမြင့်လျှင် အဆိပ်သည် မျိုးပွားအိမ် မှ ထက်ဝယ်လုံးသို့ ပြန့်နှံ့သွားကိစ္စမရှိ။ ဆေးကြောပစ်ရန် မလွယ် ကူချေ။ ထိုကြောင့် ပုတ်သိုးနေသောငါးပုတင်းသည် အဆိပ် ပို မြင့်သည်။

ငါးပုတင်းအဆိပ်ရှိသော်လည်း အခွံခွာပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ နှင့် သွေးညှစ်ပသော အသားများကို ဖယ်ရှားပါ။ ပြီးနောက် သန်ရှင်းစွာ ဆေးကြောကာ ရေကြည်တွင် ခဏကြာမှ စိမ်း၍ ချက်ပြုတ်စားသောက်လျှင် အဆိပ်တောက်ခြင်း မဖြစ်တော့ချေ။

ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင် နေထိုင်ကြသော တံငါသည် များသည် ငါးပုတင်းအသားကို အခြောက်နေလှန်းပြီးစားကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် အဆိပ်မရှိတော့ချေ။ ဂျပန်ပြည်မှ ငါးပုတင်းစည်သွတ် မှား ထုတ်လုပ်သည်။ ထိုစည်သွတ်မှားများသည် သေချာကြပ်မက်ပြီး ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချစွာစားသုံး နိုင်ပေသည်။

၂၆။ ။ မိုးရွာမသားနေတွင် ဖားအော်သံပို၍ ကျယ်လောင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။


စာဆိုတော်ဦးကြင်ဂုဏ်သည် 'မိုးတွဲတွင်' ဖားများ ပျော်ရွှင်မြူးတူး ပုံကို ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ထိုကြောင့် ဖား၏အော်သံကို ရှေးပေကော် ကတည်းက လူများ ဂရုပြုနေခဲ့ကြသည်။

မိုးရွာပြီဆိုလျှင် အင်အိုင် ချောင်းမြောင်း များဘေးတွင် ဖား များ ဆူညံနေအောင် အော်ဟစ်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အငြင်း အခဲ၌ ကျင်းပနေခြင်းလော။ အတီးအမှုတ်ပျဉ်ပွဲ ကျင်းပနေခြင်း လော။

အဘယ်ကြောင့် ဖားများ ထိုအခိုက်ကိုမှ ရွေးပြီး အာကျယ် အာကျယ် လုပ်ရသနည်း။

ဖားသည် အလွန်၊ အပူလွန်နှင့် ခြောက်သွေ့သောဒေသတွင် နေထိုင်လေ့မရှိချေ။ စိုစွတ် မြေသောနေရာတွင် နှစ်သက်စွာ နေ ထိုင်ကျက်စားကြသည်။ မိုးရွာခါနီးတွင် လေထုဖိအားနိမ့်ကျပြီးအင်္ဂါ ဓာတ်များလာခြင်းကြောင့် လေထဲရှိ ရေငွေ့များလာသည်။ ဖား တို့၏ အရေခွံသည် ရေငွေ့များစွာစုတ်မိခြင်းကြောင့် လှုပ်မြန်စွာ ရွှင်လန်းလာသည်။

ဝင်းပြင် မိုးရာသီတွင် ချိုင့်ဝှမ်းများ ရေပြည့်နေခြင်းကြောင့် ပိုး ဧကောင်မျိုးပို မျိုးပွားချိန်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းကူးမှ နိုးလာသောဖား





သည့် ထိုအချိန်တွင် အစာများစွာဖြည့်ရန် လိုအပ်ပြီး ကုန်ခန်း  
သော အားအင်နှင့် မျိုးပွားရန်အတွက် အသင့်ပြင်ထားရန် လို  
သည်။ မျိုးပွားချိန် ရောက်သောအခါ ပို၍ပျော်ရွှင်စွာ ရေထဲသို့  
ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပြီး ချောင်းဘေးနှင့် ကန်ဘေးတွင် အော်ဟစ်  
မြီးတူးနေသည်။ မျိုးစပ်ခြင်း၊ ဥအုခြင်းများပြီးသောအခါ အနည်း  
ငယ် ဆိတ်ငြိမ်လေတော့သည်။

၂၇။ ။ မြေသည် အဘယ်ကြောင့် မိမိဦးခေါင်း  
ထက်ကြီးသောကြွက်ကို မျိုချနိုင်သနည်း

“လေးဘကြီးလှသောမြေကလေး။ ဟထားလိုက်သည့်ပါးစပ်၊  
ဆင်ညှိုးကိုပင် မျိုချနိုင်ပါသိ”

အစက်ပါစာပိုမိုသည် အင်္ဂလိပ်ပုံဝတ္ထုထဲမှ မြေနှင့်ဆင်ပုံပြင်  
မှ ကောက်နုတ်သော စာပိုဒ်ဖြစ်သည်။ မြေသည် ဆင်ကိုမျိုချနိုင်  
၏လော။ မမျိုနိုင်ပေ။ ဘုံပုံပြင်မှာ လောဘကြီးသူကို သရော်  
ထမ်းသောပုံပြင်ဖြစ်သည်။

မြေများသည် ဆင်ကို မမျိုချနိုင်သော်လည်း မိမိဦးခေါင်းထက်  
ကြီးသော ကြွက်နှင့်ငှက်များကို မျိုချနိုင်သည်။ မယုံလှင်ပုံပြင်လို့  
မှတ်ပါလော။ မြေပါရှာချမ်း၏အဆိုအရ မြေပွေးသည် ယင်း၏  
ဦးခေါင်းထက် ဆယ်ဆမျှကြီးသော ငှက်ကို မျိုချနိုင်သည် ဟုဆို  
သည်။ အာဖရိကဘိုက်နို စပါးကြီးမြေသည် ဝက်ဘကောင်လုံးကို  
မျိုချနိုင်သည်။

အခြားသတ္တဝါများစွာ မိမိဦးခေါင်း၏ ထက်ဝက်မျှကြီးသော  
အရာဝတ္ထုကို မျိုချနိုင်လျှင် မျိုချ၍မရပေ။ မြေသည် အဘယ်  
ကြောင့် နှင့် ဤမျှစွမ်းဆောင်နိုင်သနည်း။

သင်နေစဉ်အသုံးပြုသည့် ကြက်ခြေခတ် မီးညှပ်ကိုယူပြီး ရှေ့  
ညှပ်ချောင်းတစ်ခုနှင့် လက်ကိုင်ညှပ်ချောင်းတစ်ခုကို တမည်းတည်း

တပြေးတည်းဖြစ်အောင် သင်ချ၍မရပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကြား  
ယောင့်ကို ၁၈၀° ပြုလုပ်၍မရ။ အိမ်သုံး ခေါက်မီးညှပ်၏ပါးစပ်ကိုမူ  
၁၈၀° မက ထို့ထက်ပင်ကြီးအောင် ချနိုင်သည်။ သတ္တဝါများ၏  
ပါးစပ်ပို၍ခိုင်ခြင်း၊ မဖွင့်နိုင်ခြင်းမှာလည်း ဤသဘောတရားနှင့်  
တူသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ပါးစပ်ရိုး တခုနှင့်တခု ဆက်ထားသောနေရာသည်  
အရိုးပြင်ပြီးသည်။ ထိုကြောင့် ဟလိုက်သောအခါ အရိုးဆစ်၏  
ဆွဲထိန်းမှုကြောင့် ကြီးစွာမဟနိုင်ချေ။ မြေ၏ပါးစပ်တွင် အရိုး  
တခုနှင့်တခု ဆက်ထားသောနေရာသည် အရိုးရှိသည့်ပြင် ဘီလတ်  
စာစ် ဆွဲကန်အားရှိသော ရော်ဘာကဲ့သို့ အမျှင်ရှိသည်။ ထို  
ကြောင့် ကြီးမားသောအဖားကို မျိုချနိုင်သည်။

မြေများအစာကိုမမျိုမီ မျိုမည့်အစာကို အရှည်လိုက်ဖြစ်အောင်  
ဆွဲဆန့်ပြီး ပါးစပ်တွင်းရှိ နှုတ်သွားဖြင့် အာခေါင်တွင်းသို့ ပို့ပေး  
သည်။ ရင်အုပ်ပိုင်းတွင် ကွင်းဆက်နံရိုးများ မရှိ၍ အာခေါင်မှ  
မျိုချသောအစာသည် အရှည်လျားလိုက် ချနိုင်သော သားဝရအိတ်  
ထဲသို့ ရောက်သည်။ မြေသည် တံထွေးများသုတ်ပြီး အစာများ  
ချောမွတ်စွာမျိုချသည်။

၂၈။ ။ မြေကို အခြားမှကိုင်ပြီး နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်  
လှုပ်ခါလျှင် ထိုမြေစေတော့သည်။ အဘယ်  
ကြောင့်နည်း

မြေအလွယ်ဆရာများ မြေဖမ်းပုံကို ကြည့်ပါလော။ မြက်တော  
ထဲမှ ဖြစ်သွားသော မြေကို အနောက်မှ အခြားလိုက်ဖမ်းသည်။  
ဖမ်းမိလေပြီ။ မြေခေါင်းလည်း ချက်ခြင်းလှည့်လာသည်။ ထိုအခိုက်  
မြေအလွယ်ဆရာသည် အလွန် လျင်မြန်ဖြတ်လတ်သောနှုန်းဖြင့်

၅၂

ပတ်စန်းကျင်မှ သတ္တပညာ

မြေကို အမြီးမှကိုင်ပြီး နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ဆန့်ခါသည်။ ထိုမြေဆိုးကြီး မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ချေ။

သင့်ရင်အုပ်ပိုင်းကို သင်ကိုင်ကြည့်ပါ။ တချောင်းနှင့်တချောင်း ချိတ်ဆက်မှုပေးသော နံရိုးကိုစမ်းမိလိမ့်မည်။ ထိုနံရိုးကို အလယ် ပဟိုမှ ရှင်အုပ်ရိုးက ချိတ်ဆက်စီရင်ထားသည်။ မြေတွင် ရှင်အုပ်ရိုး မရှိခြင်းကြောင့် နံရိုးများ တချောင်းနှင့် တချောင်း ကွဲကွာ နေသည်။

မြေ၏ကျောရိုးဆစ်များသည် အလွန်ဖျတ်လတ်သည်။ မြေများ အိပ်မောကျနေသည်ကို သင်မြင်ဘူးပေလိမ့်မည်။ ခွေခိုင်းနေသည် မှာ ဆန်ကောကြီးနှင့်တူသည်။ မြေအလပွားယဆရာသည် မြေကို အမြီးပိုင်းမှကိုင်ပြီး ခါသောအခါ ကျောရိုးဆစ်များ ပျက်သွား သည်။ နံရိုးများသည် မူလကတည်းက အဆက်အစပ်နေခြင်းကြောင့် ကျောရိုးဆစ်များ ပိုအပြတ်လွယ်သည်။ ထိုအခါ အရိုးဆစ်တံမှ အရိုးဆစ်များ ထွက်လာသည်။ တခါတပြတ်ထွားသည်။ အချို့ ဆီမျှင်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတို့ ပျက်ပြတ် သွားအခါ အသက်ပျောက်ပေလေ့ရှိသည်။


၂၉။ ။ မြေတွင်ခြေမရှိပဲ အေးအေးအေးအေး လျှင် မြန်စွာရွေ့ရှားနိုင်သနည်း

“မှန်သေတ္တာငယ်၊ လှောင်ကာလေးဟဲ့၊ ဝန်းတော် ကျားကြီး အခွေခွေ၊ မကြီးလိုချင် တပတ်လျော့ပါ။ မထွေးကိုတော့ အားလုံးမြေ။ ဗင်းစိမ်း သွယ်သွယ် ဟိုဒီတန်းလို့၊ ၂ သက်တန်းကြီးက လှည့်ကလေး။  
.....  
.....”

ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှမြေများ သစ်ပင်ပေါ်သို့ တက်လိုက် ဆင်းလိုက်၊ တန်းလန်းနေလိုက် စသည်ရှုခင်းကိုကြည့်ပြီး စပ်ထား သော ကဗျာဖြစ်သည်။ မြေတွင်ခြေမရှိပဲ ဘယ်ကဲ့သို့ သစ်ပင်ပေါ် သို့ လျင်မြန်စွာ တက်နိုင်ဆင်းနိုင်ပါသနည်း။

မြေ၏ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးကို အကြေးပြားများ ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ သို့သော်လည်း မြေ၏ကိုယ်ခန္ဓာမှ အကြေးပြားနှင့် ငါး၏ကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ်မှ အကြေးပြားတို့ ဂုဏ်သိတ္တိချင်း မတူကြချေ။ မြေ၏ကိုယ်ခန္ဓာ မှ အကြေးပြားသည် ကိုယ်ခန္ဓာ အပြင်ဖက်ဆုံး အရှေ့လွှာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မြေကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရှိ အကြေးပြားသည် အလွန်ခိုင်ခံ့ ပျော့ပြောင်းသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးထွားသကဲ့သို့ လိုက်ပြီး မကြီးထွားနိုင်။ ထိုကြောင့် နှစ်လ၊ သုံးလတကြိမ် အရှေ့ လဲပြောင်းရသည်။ လဲပြောင်းပြီးသောအခါ အကြေးပြား ပို၍ ဖြိုး လာသည်။ ယခင်ကထက်ပို၍ ခိုင်ခံ့ ပျော့ပြောင်းလာသည်။ မြေ၏ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရှိ အကြေးပြားသည် ကိုယ်ခန္ဓာကို ကာကွယ်ထား သော ‘သံချင်အင်္ကျီ’ ဖြစ်သည်ပြင် ရွေ့ရှားသွားလာရန် တခုတည်း သော ‘ကိရိယာ’ ဖြစ်သည်။

မြေများတွင်းသွားစဉ် ယင်း၏သေးငယ်ရှည်လျားသော ကိုယ် ပုံဏ္ဍာန်သည် ‘S’ ပုံ တိတိကျကျ ကွေးနေသည်။ ‘S’ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ သံလမ်းပေါ်တွင် ပြေးနေသော ရထားတွဲကြီးနှင့်တူသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ၏ နောက်ဖက်ပိုင်းသည် ရှေ့ဖက်ပိုင်း ရွေ့သောနေရာ သမ်း ကြောင်းအတိုင်း လိုက်ရွေ့သည်။ မြေရွေ့ရှားစဉ် ‘S’ ပုံသဏ္ဍာန် ၏ ဖုတ်သောအပိုင်း၏ အကြေးပြားသည် အနည်းငယ်ကြွလွတ် နေသည်။ ထိုကြွနေသော အကြေးပြား၏ အချွန်ပိုင်းကို အသုံးပြု ပြီး မညီညာသော မြေမျက်နှာပြင်ကို ဆွဲထားသည်။ ထိုအခါ အကြေးပြားသည် မြေကဲ့သို့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှေ့သို့ ရွေ့ရှားစေသည်။ မြေကိုယ်ခန္ဓာ၏ အပြင်ဖက်အရှေ့သည် အလွန်ပျော့ပျောင်း သည်။ အကြေးပြားနှင့် မြေမျက်နှာပြင်တို့ ထိတွေ့သောအခါ ယင်း ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းသည် ဦးစွာ ရွေ့ပြီး နောက်အပူခွံသည်



ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိုက်ပြီး ရှေ့သို့ ရွေ့သည်။ ဤကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုသည် တွားသွားစဉ်သာ အထောက်အကူပြုသည် မဟုတ်။ သစ်ပင်ကြီးပေါ်သို့ တက်သော အခါတွင်လည်း များစွာ အသုံးဝင်သည်။ အကယ်၍ မြွေကို ချောမွတ်သော ယှဉ် (သို့) မှန် (သို့) သံမြေပေါ် တင်ထားပါက မြွေမှာ မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပေ။ ထိုကြောင့် မြွေကို 'မြက်ခင်းမာရသွန်' ဟု ခေါ်သည်။



၃၀။ ။ မြွေကိုရိုက်လျှင် 'ခုနစ်လက်မ' ကို ရိုက်ရသည် ဆိုရိုးရှိသည်။ မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်နည်း

'အမလေး...၊ မြွေကြီး...' သင်အော်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အုတ်ခဲ [သို့] ဝါးခြမ်းရှာပြီး မြွေကိုလိုက်ရိုက်လိမ့်မည်။ မြွေကိုရိုက်လျှင် ချက်ကောင်းမိရန် လိုသည်။ မြွေကို ရိုက်လျှင် 'ခုနစ်လက်မ' ဟူသည့် ဆိုရိုးစကားရှိသည်။ အချို့ကလည်း 'သုံးလက်မ' ဆိုကြသည်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော၊ ဆိုရိုးစကားများသည် အတွေ့အကြုံမဟုတ်သောပေ။ ပေါက်စွားလာသော စကားခွန်းများဖြစ်ခြင်းကြောင့် သူ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်သူ လေးနက်နေသည်။ 'ခုနစ်လက်မ' ဖြစ်စေ 'သုံးလက်မ' ဖြစ်စေ တူညီသောအချက်မှာ မြွေ၏ကျောရိုးကို ရိုက်ရန် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

သတ္တဝါ၏ကျောရိုးကျိုးသောအခါ အကြောများပြတ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ တခုနှင့်တခု အဆက်ပြတ် နေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ထိုတချက်ကို အပြီးပိုင်းပေါ်တွင် ရိုက်မိပါက အမြေအနေ လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ အိမ်မြှောင်ကောင်ကို သင်အပြီးရိုက်မိက အပြီးကိုစွန့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် 'အိမ်မြှောင်အပြီးပြတ်' များကို နေရာတကာ တွေ့ရစေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်မေးလိမ့်မည်။ ဒီလိုဆိုမှင် 'မြွေကိုရိုက်လျှင် ကျောရိုး' ဟု မဆိုပဲ အဘယ်ကြောင့် 'ခုနစ်လက်မ'၊ 'သုံးလက်မ' စသည်တို့


ပြောဆိုရသနည်း။ အဖြေကား 'သုံးလက်မ' သည် မြွေ၏အရိုးကျိုးရန် အလွယ်ဆုံးသော နေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာကို ကျိုးအောင် ရိုက်လျှင် ဦးခေါင်းထောင်ပြီး မကိုက်နိုင်တော့ချေ။ 'ခုနစ်လက်မ' သည် မြွေ၏ အသည်းနှလုံးတည်ရာ နေရာဖြစ်သည်။ ထိုကိုယ်ခန္ဓာ၏ 'နှိုးစက်' ပျက်စီးသွားလျှင် စက်နမူချသောရလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မြွေတိုင်း 'သုံးလက်မ'၊ 'ခုနစ်လက်မ' ဟူ၍ မဟုတ်ချေ။ မြွေအမျိုးအစားအလိုက်ပြီး အနည်းငယ် ကွဲပြားလိမ့်မည်။

လူများသည် မြွေကိုတွေ့လျှင် ရိုက်ချင်ကြသည်။ မြွေမျိုးတွင် အဆိပ်ပြင်းမြွေများရှိသည်။ မြွေဟောက်၊ မြွေပွေး၊ မြွေစိမ်း စသည်တို့၏ ကိုက်ခြင်းခံရလျှင် သေရှာရောက်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း မြွေဘုရင်၊ လင်းမြွေစသော မြွေများသည် လူကိုအန္တရာယ်မပေးသည့်ပြင်ရောဂါပိုးပြန့်ပွားစေသည့်ကြွက်များကိုကူညီရှင်းပေးသည်။

မြွေဆိုးမြွေကောင်းကို အရောင်အဆင်း မြင်ရုံမျှဖြင့်မခွဲခြားအပ်။ အရောင် ညစ်ပုပ်သော လင်းမြွေသည် အပြင် အရောင် အဆင်း ကြောက်စရာ ကောင်းသော်လည်း မြွေဆိုးမဟုတ်ချေ။ အပြင်ပန်းလှပသည့် မြွေပွေးသည် အဆိပ်ပြင်းသော မြွေဖြစ်နေသည်။ မြွေပွေးကိုကိုင်ခံရသောအခါ ဒဏ်ရာအပေါ်ပိုင်းကို ပတ်ဘီး ကြပ်ကြပ်စည်းထားပါ။ ပြီးနောက် ဒဏ်ရာမှအဆိပ်သွေးများ ညှစ်ထုတ်ပြီး နီးရာ ဆေးရုံသို့ အမြန်ပြေးပါလေ။

၃၁။ ။ မြွေအလမ္မာယ်ဆရာ၏ မြွေသံကို ကြားသော် မြွေဟောက်များ ထကကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

လူအုပ်ကြီး၏အလယ်တွင်ကုလားမြွေအလမ္မာယ်ဆရာကြီးသည် အားကောင်းကောင်းနှင့် ပါးဖောင်းပြီး မြွေမှတ်နေသည်။ ထိုမြွေအလမ္မာယ်ဆရာကြီးသည် ခွေရက်ထိုင်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်း တီး



လုံးများမှတ်ပြီး အာရုံဆွဲဆောင်နေသည်။ ခဏကြာသော် မြွေဟောက်ထည့်ထားသော ခြင်း၏အဖုံးကို ဧွန်လိုက်သည်။ မြွေဟောက်၏လည်ပင်း အပြင်သို့ ဆောင်တက်လာပေပြီ။ ထိုအခါ မြွေဟောက်၏လည်ပင်းသည် ဖောင်းရွက်ပြီးလာသည်။ မျက်မှန်သဏ္ဍာန် အရစ်ကြောင်းလည်း အထင်းသား ပေါ်နေသည်။ မြွေအလမွှာယဆရာကြီးသည် အားကုန်ထုတ်ပြီး မှုတ်နေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း ဘယ်ယိမ်းညှာယိုင်၊ ခေါင်းကိုလည်း ဘယ်ယိမ်းညှာယိုင် အလွန်စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ အားသွန်ခွန်ခိုက် မြွေမှုတ်နေသည်။ မြွေဟောက်၏ခေါင်းပိုင်းသည်လည်း မြွေအလမွှာယယိုင်သကဲ့သို့ ဘယ်ယိုင်ညှာယိုင် ဘယ်ယိမ်းညှာယိမ်း ပြုနေသည်။ မြွေဟောက်ကြီးသည် တေးဂီတသံကို နားလည်သကဲ့သို့ မြို့မနေသည်။ မြွေအလမွှာယမှုတ်သော တီးလုံးအတိုင်း ထကနေသည်။

သို့သော်လည်း မြွေအလမွှာယဆရာကြီးမှာ ကိုလူညာကြီးသာ ဖြစ်သည်။ လိမ္မော်ညာဖက်တွင် ပါရဂူအဖွဲ့ပေးလျှင် သူ့အပြင် မည်သူရနိုင်အံ့နည်း။ ကျွန်မောင်ကား မြွေအလမွှာယဆရာကြီးအား ဂရုဏာသက်မိသည်။ အကြောင်းမှာ မြွေအလမွှာယဆရာကြီးသည် အလုပ်လက်မဲ့ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရန် ဤသို့ဤရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ‘အမှန်တရားသည် ဘယ်တော့မှဖုံးကွယ်၍မရ’ ဟူသကဲ့သို့ ယနေ့ယိပွဲခေတ်တွင် သာန္တီပင် ဖုံးကွယ်ထား၍မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။

အဖြစ်မှန်မှာ ဤသို့သာဖြစ်သည်။

မြွေဟောက်သည် တေးဂီတကို နားမလည်ပါ။ မြွေအလမွှာယဆရာမှုတ်သော စူးရှသည့် ပြေယွန်၏ ဆွဲပေးမှုကြောင့် ခေါ်ပွဲ စိတ်မာန်ထပြီး ပါးပျဉ်းထနေခြင်းဖြစ်သည်။ မြွေအလမွှာယ၏ လှုပ်ရှားသောကိုယ်ကို ကြည့်ပြီး လိုက်လှုပ်ရှားနေခြင်းမှာ ပေါက်ရန်အချက်ကောင်း ရှာနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ တေးဂီတ၏ စည်းဝါးကျသော တီးလုံးကို နားလည်မှုသာကြောင့် မဟုတ်ပါချေ။ အမှန်ကား ယနေ့တိုင်အောင် တေးဂီတသံနားလည်သော မြွေမျိုးမရှိ

သေးပါ။ တေးဂီတသံ ကိုနားထောင်ပြီး ကြည့်ပါ။ သာသနာ့ဗိမ္ဗိတီခွဲချေ။ ရုပ်ရှင်တွင်၎င်း၊ ဖတ်ကပ်ပွဲတွင်၎င်း အချို့မြို့ကွဲသံများတွင် မြွေ၊ ကျား၊ မြို့သေ့ စသည့်တိရစ္ဆာန်များကို တေးဂီတသံ နားထောင်ပြီး ဧည့်ဝါးကျ တီးလုံးကိုလိုက်၍ သရုပ်ဆောင် ကပြနိုင်သကဲ့သို့ ပြုထားသည်။ အဖြစ်မှန်ကား တေးဂီတသံ၏တီးလုံးကို လိုက်ရစ္ဆာန်များ နားထောင်ပြီး လိုက်လှုပ်ရှားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထိုတိရစ္ဆာန်များ၏ သွယ်ရှားမှုနှင့်ကိုက်ညီသော တေးဂီတတီးလုံးဖြင့် လိုက်တွဲပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။

၃၂။ ။ လိပ်ကျော့တွင် အဘယ်ကြောင့် မာကျောသော အခွံရှိသနည်း

“သံခမောက်ကို ထိပ်မှာဆောင်းလို့၊ ခြီးခေါင်းဝှက်တဲ့ သတ္တဝါ။ မြွေလက်တိုတို ကိုယ်ကဝိုင်းတော့၊ ပြေးကိုင်း ရှူးလိမ့်ထင်ရတာ။ ကုန်းမှာနေမှာ အနေသားကွဲ့၊ သစ်ရွက်ဝါးလို့ မြီးစားကာ။ မယ်ထွေးခိုင်က ဟန္တာမဟာ၊ လူစင်စင်က လိပ်ဖြစ်ရှာ။ တခါအုယင် တပြုကြီးပေါ့၊ ရေစီးသောင်စပ် သံပြင်မှာ။ တောတွင်း လိပ်ကို လောင်စာ မီးနဲ့၊ လက်ခုပ်တီးယင် ထွက်လို့လာ။ ဖမ်းပါ ဖမ်းပါ။

လိပ်သည် အထက်ခေတ်ပြုပါ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့်ပြင် အခြားတိရစ္ဆာန်များထက် ထူးခြားချက် များစွာရှိသေးသည်။

လိပ်သည် အဆုတ်ဖြင့် အသက်ရှူသည်။ သဘောထား နူးညံ့သည်။ အဒေဏ်နှင့်အစာဝတ်ဝတ်ကို ကြာရှည်စွာ ခံနိုင်သည့်ပြင် တိရစ္ဆာန်များထဲတွင် ဖိုးသက်ရှည် ဖြစ်သည်။ ခြေလေးချောင်းဖြင့် ရေကူးနိုင်သည့်ပြင် ဘုန်းပေါ်တွင်လည်း တွားသွားနိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ပြားပြီး ကျယ်ပြန့်သည်။ မာကျော ခိုင်ခံ့သော



www.burmeseclassic.com

လိပ်ခွံဆောင်းထားသည်။ ကျောခွံများ အဝါရောင် (သို့) အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး ရင်အုပ်ခွံပိုင်းသည် ပို၍ အရောင်မြောသည်။ အမျိုးအစားအလိုက် အရောင်အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနားသည်။

လိပ်ခွံသည် အပြင်ရိုး ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှားခြင်းကို ထိန်းပေးသည့်ပြင် ခန္ဓာတွင်းအင်္ဂါများနှင့် ကိုယ်တွင်းမှ ရေငွေ့ပျံခြင်းကို ကာကွယ်ထားသည်။ ရန်သူနှင့်တွေ့သောအခါ ဦးခေါင်း၊ အမြီးနှင့် ခြေလေးချောင်းတို့ကို လိပ်ခွံထဲတွင် ဝှက်ထားသည်။

လိပ်ခွံ၏ဗဟိုတွင် သုံးကြောင်း သင်ရှားစွာ ခွဲခြားထားသည်။ စုစုပေါင်း ၁၃ တွက်ရှိသည်။ ယင်းကို 'အဓိကအခွံ' ဟု ခေါ်သည်။ ဗဟိုအကြောင်းရှိ ငါးတွက်ကို 'ကျောရိုးခွံ' ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောရိုးမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘေးနှစ်ဖက် တကြောင်းစီတွင် စုစုပေါင်း ဂျင်တွက်ရှိသည်။ ယင်းကို နံရိုးခွံ ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် နံရိုးမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ကန္ဓာအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာစဉ်က ရာသီဥတု စိုစွတ်ခြင်းမှ မုန်းခြောက်ခြင်းသို့ ပြောင်းလဲလာသည်။ အချို့ သမုဒ္ဒရာများ ကုန်းမြေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကုန်းနှင့်ရေတွင် ကျက်စားသော သတ္တဝါများသည် ကုန်းပေါ်သို့ ရောက်စေသည်။ ကုန်းပေါ်တွင်နေထိုင် ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းမှ ရေငွေ့များ အငွေ့ပျံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် မာကျောသော အခွံဖြစ်ပေါ်လာရသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်၏ပြောင်းလဲမှုသည် သက်ရှိများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ သက်ရှိများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာများလည်း လိုက်ပြောင်းမှသာ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်သစ်တွင် နီးချော်စွာ နေထိုင်စားသောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သဘာဝ၏ အပြောင်းအလဲတို့ကို အကြိမ်ကြိမ် ဆုံတွေ့စားချီးသောအခါ မိမိအတွက် ကောင်းသော အရာများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ကြစေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန်သာ ပြောင်းလဲသည်မဟုတ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းလည်း လိုက်လံပြောင်းလဲရသည်။ ဤသည်မှာ ရုပ်နှင့်ခန္ဓာ အပြောင်းအလဲ တူညီခြင်းဖြစ်သည်။

၃၃။ ။ လိပ်ကျောပေါ်တွင် စိုစွတ် နေပါက မိုးရွာတော့မည်ဟု သိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။



လိပ်ကို သက်ရှိ မိုးလေဝသတိုင်း မီတာဟုခေါ်ဆိုလျှင် မည်သူ မှ မမြင်ကြပေ။


သင်ဝရုရှိက် လေ့လာပါ။ အကယ်၍ လိပ်၏ ကျောခွံသည် မြောက်သွေ့နေပါက ယခုရက်အတောအတွင်း နေသာလိမ့်မည်မှာ ကေန်လေ့။ အကယ်၍ လိပ်၏ကျောခွံပေါ်တွင် စိုစွတ်နေပါက သင်အပြင်ထွက်လျှင် ထီးယူရန် အမေ့မိပါနှင့်။

မည်သို့သော သဘောတရားအပနည်း။

လိပ်၏ကျောခွံကိုလေ့လာကြစို့။ (၁) လိပ်၏ကျောခွံအက်ကြောင်းများသည် အလွန်စိပ်ခြင်းကြောင့် ရေစုတ်ခြင်း၊ မေ့ယုတ်ခြင်းအလွန်နည်းသည်။ (၂) လိပ်သည် အပူချိန်ပြောင်း သတ္တဝါဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျောခွံကိုတည်မြဲသော ကိုယ်အပူချိန်များ မထိခိုက်၊ မသက်ဆိုင်နိုင်ချေ။

ထိုအချက်နှစ်ချက်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းကြောင့် လေထုထဲရှိ ရေခိုးရေငွေ့ကို တုန်ပြန်နိုင်သည်။

နေသာသောနေ့တွင် လေထုထဲတွင် လေဖိအား ပြင်းပြင်းကြောင့် ရေငွေ့ပျံသော ရေယာ ကျယ်ဝန်းသည်။ ထိုကြောင့် လိပ်၏ကျောခွံနှင့် တွေ့ထိသော ရေခိုးရေငွေ့ သည်နည်းပါးခြင်းကြောင့် မြောက်သွေ့နေသည်။ မိုးရွာခါနီးတွင် လေထုတွင်းရှိ လေဖိအား လျော့နည်းလာပြီး ရေခိုးရေငွေ့ ပို၍ သိပ်သည်းလာသည်။ မြက်ကြီးနှင့် နီးကပ်လေလေ ရေခိုး ရေငွေ့ သိပ်သည်းလေလေဖြစ်



ခြင်းကြောင့် လိပ်၏ကျောခွံနှင့် တွေ့ထိသော ရေခိုးရေငွေ့သည် အလွန်သိပ်သည်းခြင်းကြောင့်၎င်း၊ ကျောခွံ၏ ခြင်းကြောင့်၎င်း၊ ရေခိုးရေငွေ့များ ကျောခွံပေါ်တွင် ပို၍စုနေသည်။ ထိုကြောင့် ကွန်ပရက် လိပ်ကျော စိစုတ်နေသည်ဟု မြင်ရတော့သည်။

အမှန်ကား မိုးရွာခါနီးတွင် လိပ်၏ ကျောခွံပေါ်တွင်သာ စိစုတ်သည် မဟုတ်။ ကျောထဲပြားများ၊ အင်္ဂတေများ ပေါ်တွင်လည်း စိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သဘောတရားမှာ လိပ်ကျောစိရခြင်းနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။

၃၄။ ။ အဘယ်ကြောင့် အချို့ တိရစ္ဆာန်ငယ်များသည် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကို ကြိုတင်သိရှိကြသနည်း

‘ပျံလွှားနှင့်ပျံ၊ မိုးကြိုးလာ။’

‘မြေကူးလူးမြတ်၊ တိမ်လွှာနက်။’

အထက်ပါ မိုးလေဝသ နေ့မှန်း ဆိုခိုးစကားများသည် တောင်ပူငယ်သမားများ၏ အတွေ့အကြုံ တွေ့ရှိချက်မှ ပေါက်ဖွားလာသော ဆိုခိုးကောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။

တိရစ္ဆာန်များ၏ အမူအရာပြောင်းလဲခြင်းကို ကြည့်ပြီး မိုးလေဝသ အခြေအနေကို ခန့်မှန်းခြင်းသည် မှန်ကန်သည်ဖြစ် သိပ္ပံသဘောတရားနှင့်လည်း ကိုက်ညီသည်။

ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲကို ကြိုတင်သိနိုင်သော ‘တိရစ္ဆာန်များ’ စွာရှိသည်။ ဥပမာ၊ ဖား၊ ပုရွက်ဆိတ် နှင့်ငါးမျိုးအချို့တို့ဖြစ်သည်။ ဖားဆိုသည် မိုးလေဝသ အပြောင်းအလဲကို တုံ့ပြန်ပုံချင်း (နေထိုင်ပုံ ပြောင်းလဲခြင်း) ကဲ့ပြားခြားနားကြသည်။ ငါးသလဲထိုးကို ဥပမာအဖြစ် တင်ပြပါအံ့။

ငါးသလဲထိုးသည် သက်ရှိ မိုးလေဝသတိုင်း ကိရိယာဟု ခေါ်ဆိုလောက်အောင် တိကျသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သူနှင့်ခဲလုံးများ ထည့်ထားသော ဖန်အိုးထဲတွင် မွှေးမြှူထားသော အခါ တိုရေသားတူးရှိ အောက်စီဂျင်ကို အသုံးပြုပြီး အသက်ရှင်နေသည်။ သေသုတ်တွင် လေဖိအားမြင့်သောအခါ ကောင်းကင်ယံတွင် ခရမ်းရေငွေ့နည်းခြင်းကြောင့် ရေတွင် အောက်စီဂျင် ပျော်ဝင်ခြင်း များသည်။ ထိုအခါ ငါးသလဲထိုးသည် ရေဖန်အိုးရှိ သပေါ်တွင် ပြဲသောက်စွာ အိပ်စက်နေမည်။ ဤအခြင်းအရာသည် ရာသီဥတု သဘောခြင်းကို ပြသည်။ အကယ်၍ လေထုများ စိစုတ်သောအခါ လေထုဖိအား နိမ့်၍လာပြီး ဖန်အိုးတွင်းရှိ ရေတွင် အောက်စီဂျင်ဓာတ် မလျော့နည်းလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ငါးသလဲထိုးသည် သပေါ်တွင် ငြိမ်သက်စွာ အိပ်စက်ခြင်း မပြုနိုင်တော့ပဲ ရေပေါ်သို့ ခေါ်လာသည်။ ဤနည်းစွာ ကူးလူးသွားလာပြီး မနေ့ဖက် မထိုင်တတ် ဖြစ်နေသည်။ တခါတရံ ရေပေါ်သို့ ခုန်တက်သည်။ ထိုအခြင်းအရာသည် မိုးလာတော့မည်ကို ကြိုတင် သိရှိခြင်းကိုပြသည်။ အကယ်၍ ယင်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ရေပေါ်သို့ ခေါ်သော သံပုံမှာ နှုတ်မြင်မလွှတ်မရှားပေါ်လာပြီး ကြာရှည်စွာ ဤအတိုင်း ရေပေါ်တွင် ခေါင်းထိုး ဖော်ထားပါက မိုးသည်းထန်စွာ ရွာတော့မည်ကို ပြသည်။ အကယ်၍ ယင်း၏ ကိုယ်သည် အပေါ်အောက် မတ်နေပြီး ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ရှား၍ ခေါင်းကို မကြာခဏ ရေပေါ်သို့ ဖော်ကာ အသက်ရှူပြီး လျင်မြန်စွာ ဖော်ပေါက်မှ လေပြန်ထွက်လျှင် လေမုန်တိုင်း ကျတော့မည်ကိုပြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ငါးသလဲထိုးသည် ရာသီဥတုအခြေအနေများကို အလွန်တိကျစွာ ဖော်ပြသည်။



၃၅။ ။ ငှက်များသစ်ကိုင်းပေါ်တွင် နားအိပ်  
သောအခါ အဘယ်ကြောင့်ပြုတ်ကျခြင်း မဖြစ်  
သနည်း

သစ်ပင်ပေါ်တွင် နားလေ့ရှိသော ငှက်များသည် သစ်ပင်  
ပေါ်တွင်ပဲ နားအိပ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း အိပ်ပိုက်ခြင်းကြောင့်  
ပောက်သို့ ပြုတ်ကျခြင်း မဖြစ်ပေါ်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း...။  
သစ်ပင်ပေါ်တွင် နားအိပ်သော ငှက်များ၏ ခြေချောင်းပုံများ  
သည် သစ်ကိုင်းများကို ဖမ်းထားရန် အသင့်ဖြစ်အောင် တည်  
ပေးထားသည်။ ငှက်များ သစ်ကိုင်းပေါ် နားပုံကို သေချာစွာ  
လေ့လာပါလေ။ ထိုငှက်များ သစ်ကိုင်းပေါ် ကျရောက်သာအခါ  
လည်ပင်းရိုး ကွေးပြီး အသားလေး ဝပ်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင်  
ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အလေးချိန်အားသည် ခြေရိုးလေးပေါ် ကျရောက်  
နေသည်။ ခြေရိုးနေအင်္ဂါရှိ အကြောကိုလည်း တင်းနေစေသည်။  
၎င်းပြင် ခြေချောင်းရိုးဝယ်များရှိ ကွေ့ကောက်သော အကြော  
များကိုလည်း တင်းနေစေသည်။ ထိုအခါ ခြေချောင်းများသည်  
ပေးအကာကံပြီး သစ်ကိုင်းကို ခိုင်ခံ့စွာ ဆုပ်ထားလေတော့သည်။  
ထို့ကြောင့် ငှက်များ သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် နားပြီး အိပ်နေသော်လည်း  
ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့် သစ်ကိုင်းကို တင်းတင်း ဖမ်းဆုပ်ထားနိုင်  
သည်။ ဖက်ရပ်သောအခါ ခြေချောင်းအဖျားများ ဆန့်ထွက်  
လေတော့သည်။


အခြား အကြောင်းချက်မှာ ငှက်များ၏ ဦးနှောက်သည်  
အမြီးတွင်းသွားတိရစ္ဆာန်များထက် ဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားသည်။ ယင်း  
၏ ဦးနှောက်ကြီးထက်ထက်တွင် အရစ်များမရှိသော်လည်း နှိုင်း

ယှဉ်လျှင် လွန်စွာ ပိုကြီးသည်။ ဦးနှောက်ငယ်ကား အဖွံ့ဖြိုးဆုံး  
ဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် ချပါရုံကို သွက်လက်စွာ အပြောင်းအလဲ  
ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်ကို ကောင်းစွာ ညီမျှခြင်း၊  
ထိန်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ငှက်များ သစ်ကိုင်းပေါ်တွင် နား  
အိပ်သောအခါ ပြုတ်ကျခြင်း မဖြစ်ပေါ်ချေ။

၃၆။ ။ ပျံလွှားငှက်များ သမုသဒ္ဒရာကို ကျော်  
ဖြတ်ပျံသန်းစဉ် မည်သည့်နေရာတွင် အနားယူ  
သနည်း။ မည်သည့်အစာကို စားသနည်း

အာရှတိုက်မှ ပျံလွှားများသည် မတ်လဆန်းတွင် အာရှတောင်  
ပိုင်းမှ မြောက်ပိုင်းသို့ ပျံသန်းလေ့ရှိသည်။ ဒိုးဦးစတွင် တောင်  
ပိုင်းသို့ ပြန်လာသည်။ ဤကဲ့သို့ ခရီးရှည် သွားလာပျံသန်းပုံကို  
သမိုင်းအကိုးအကားဖြင့် ပြုနိုင်သည်။

အာရှပျံလွှားများသည် များသောအားဖြင့် ဖိလိပိုင်၊ မလေး  
ရှားကျွန်းဆွယ်၊ အိန္ဒိယ၊ နယူးဂီနီနှင့် ဩစတြေးလျားမြောက်ပိုင်း  
တို့တွင် ဆောင်းကူးလေ့ရှိသည်။ အချို့ပျံလွှားများသည်။ ဖော်မို  
ဆာမြောက်ပိုင်းတွင် ဆောင်းကူးကြသည်။ ပျံလွှားငှက်များပြောင်း  
ရွှေ့ပျံသန်းစဉ် သောင်းနှင့် ချိုပြီး အုပ်စုဖွဲ့ ပျံသန်းပြောင်းရွှေ့  
လေ့ရှိသည်။ ၉°C အပူ အချေ လမ်းကြောင်းကို လိုက်ပြီး မြစ်  
ချောင်းအင်းတိုင်းမှ ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်း ပျံသန်းပြောင်းရွှေ့သည်။  
ပျံလွှားငှက်များ၏ ပျံသန်းနည်း အလွန် လျင်မြန်ခြင်းကြောင့် ပျံ  
သန်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို နေ့ပိုင်းပြုလုပ်ကြသည်။ မြေကြီးပေါ်တွင်  
အစာတဖက်ရှာရင်း ရန်သူကို ရှောင်ရင်းဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ပျံသန်း  
ကြသည်။ ပျံလွှားများ အနားယူချိန်တွင် လမ်းကြီးတစ်လျှောက်ရှိ  
ခက်ကြီးပေါ်တွင် ပြည့်ကြပ်စွာ နားနေကြသည်။ ပျံလွှားများပျံ  
သန်းစဉ် တနေ့လျှင် မိုင် ၁၄၀ မျှ ခရီးရောက်သည်။ အကယ်၍



မုန်းမြောင့်အတိုင်း ဖျံသန်းလျှင် အများဆုံးတနေ့ ၂၉၀ မိုင် ဖျံသန်းနိုင်သည်။

ဖျံလွှားငှက်များ သမုဒ္ဒရာပြင်ကူးစဉ် ပင်လယ်ကျွန်းများ တခုနှင့်တခု ဆက်လပ်သောနေရာလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဖျံသန်းသည်။ ဤဖျံမြင့် တကျွန်းမှ တကျွန်းသို့ လွယ်ကူစွာ ဖျံသန်းနိုင်သည်။ အစားကုန်လည်း သက်သာသည်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးများကို ကျော်ဖြတ်ဖျံသန်းစဉ် နှလုံးများစွာ အကုန်ထုတ်သုံးရသည်။ အဲဒါတွေယ်အလျင်မြန်ဆုံးသော နှုန်းမြင့် ဖျံသန်းရသည်။ ထိုလမ်းခရီးသည် ဖျံလွှားများအတွက် အန္တရာယ်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။

အာရှ ဖျံလွှားများအစို့ တောင်ပစ်ဖိတ် သမုဒ္ဒရာ မျက်နှာပြင်သည် အကော်စီဆိုးသော ခရီးဖြစ်သည်။ သို့ပင် ပညာရှင်များ၏ စာရင်းဇယားအရ နှစ်တနှစ်တွင် ပေါက်ဖွားသော ဖျံလွှားငယ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထိုလမ်းကြောင်း၏ 'ခရီးရှည်'ပေါ်တွင် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။

ဖျံလွှားငှက်များ သို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ မဖျံသန်းမီ ကာလတွင် ယင်းတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာပင်တွင် အဆီများစွာ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ခရီးစဉ် တလျှောက် တာဝန်များစွာ ကိုယ်ခန္ဓာပင်တွင် သိုလှောင်ထားသော အဆီဖြင့် အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။ ဝေယျာဉ်ဖျံများ မဖျံသန်းမီ ဆီထိုးသက်သို့ သမုဒ္ဒရာကြီးဖြတ်သန်းရန်အတွက် စွမ်းအင်စုဆောင်းရသည်။ လျှောင်အိမ်တွင် ခန္ဓာပြုထားသော ငှက်ကို ဘရက်မျှအစာပေးပြီး မိကျွေးခဲ့လျှင် နားအေးအောင် ဆူညံနေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ဖြတ်သန်းစဉ် အဆီပြည့်နေသော ဖျံလွှားငှက်များသည် လေထဲမှ ရက် အစာမစားသော်လည်း အစာငတ်မသေကြချေ။


၃၇။ ။ စင်ရော်များ အဘယ်ကြောင့် ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောနောက် လိုက်ပြီး ဖျံသန်းရသနည်း

သင်္ဘော ခုတ်မောင်းသူများနှင့် စင်ရော်ငှက်များ သင်္ဘောနောက်ပိုင်းလိုက်ပါနေသည်ကို မြင်သူများက ပေးလိမ့်မည်။

စင်ရော်များ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကို လိုက်ပြီး ဖျံခြင်းမှာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောပေါ်တွင် ထူးခြားသော အရာ ပါခြင်းကြောင့် စင်ရော်ကို ဆွဲဆောင်နေခြင်းလော၊ ဟုတ်ပါသည်။ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောပေါ်တွင် ထူးခြားသော ဘရံတခုသော အားသည် စင်ရော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပင့်ထားပြီး အတောင်ခတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရောမလိုပဲ ငြိမ်သက်စွာ ဖျံဝဲနေစေသည်။

စင်ရော်ကို ပင့်ထားသော ထိုအားသည် ကျွန်ုပ်တို့ စဉ်းစားသကဲ့သို့မဟုတ်။ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောပေါ်မှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းလည်း မဟုတ်။ ထိုအားသည် ကောင်းကင်ပညာမှ လာခြင်းဖြစ်သည်။

'လေဟူသည်မှာ လေထုလှုပ်ရှားခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်သော အရာ' ဟု ဂြိုဟ်ဗေဒပညာရှင်တို့က ဆိုထားသည်။ လေထုထဲတွင် အပူချိန် မတူညီခြင်းကြောင့် လေထုလှုပ်ရှားခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ အထူးသဖြင့် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွင် လေထုလှုပ်ရှားရာတွင် ခုခံမှုတစ်ခု (ခပမာ) ပင်လယ်ပြင်လျှင်၊ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောနှင့် ကျွန်းဆွယ်) နှင့် ဆုံမိလျှင် အပေါ်သို့ထွက်ပြီး အင်အားကောင်းသော လေစီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုလေစီးကြောင်းကို အရွေ့လေစီးကြောင်းဟု ခေါ်သည်။ စင်ရော်သည် တောင်ပံကို ကားပြီး ထိုဘက်လာသော လေ





စီးကြောင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြု၍ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပင့်ထားစေကာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘော၏ကောင်းကင်ပေါ်တွင် ပျံနေသည်။

ဝင်ရောက် အဓိကအစာသည် ငါးဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများ ခုတ်ခောင်းစဉ် သင်္ဘောပံ့ပိုးတွင် ရေလှိုင်းကြီးများ ထနေသည်။ ပင်လယ်ထဲမှ ငါးများ အပေါ်သို့ ပါလာသည်ကို မြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် စင်ရော်များ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကို လိုက်ပြီး ပျံသန်းခြင်းဖြစ်သည်။

၃၀။ ။ ခေါင်းငှက်များသည် အရောင် အဆင်း လှသော အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားသော သူ့ကို မြင်လျှင် အမြီးကား ပြလေ့ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ခေါင်းငှက်ကို စတင်မြင်သောသူများသည် ခေါင်းငှက်၏ လှပသော အတောင်အဆင်းများကြောင့် အနားမှမခွာနိုင်ဘဲ ခြစ်နေသည်။ ခေါင်းဖိုနှင့်ခေါင်းမကို သင် သေချာဂရုစိုက် လေ့လာကြည့်လျှင် ခေါင်းဖိုသည် ခေါင်းမထက် ပို၍ လှပသည်ကို သင်တွေ့ရမည်။ အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံပေဒေဟညောင်တန်းက ထိုဖို-မခေါင်းတောင်ပံတို့၏ အဆင်းအရောင်ကို “ဖို ဇယ်ရှားခရောင်” ဟု ခေါ်သည်။

ငှက်မျိုးသည် လျင်မြန်ဖုတ်လက်သော အထက်တန်း သတ္တဝါတမျိုးဖြစ်သည်။ အတတ်ပညာတွင် တဖက်ကမ်းခတ်အောင် တတ်မြောက်ကြသည်။ ထိုမိတ်ကို ၆-၈ ဖယ်ရှားရောင် ကဲ့သို့သော အတတ်ပညာတွင် ငှက်မျိုး၏ ထင်ရှားလှသည်။ ခေါင်းငှက်များကဲ့သို့ တလင်လျှင် မယားပေါင်းများစွာ ယူနိုင်သောငှက်မျိုးတွင် အမည်အနေ၏ ဖန်တီးမှုကြောင့် ထိုအတတ်ပညာများ ပို၍ပေါ်လွန်းသည်။

ခေါင်းငှက်များ ချစ်ရေးဆိုးသောအခါ အဖိုနှင့် အမိငှက်ချင်း ပြိုင်ကြသည်။ အငှက်ကို ချစ်ရေးဆိုးရာတွင် ကြက်ကဲ့သို့ အကြမ်း


နည်းကိုမသုံး။ ခေါင်းဖိုနှစ်ကောင် အတောင်ကား၍ အလှပြိုင်ခြင်းဖြင့် ခေါင်းမကို ပြိုင်ယူကြသည်။ အဆင့်အတန်းမရှိသော မလှပသော ခေါင်းဖိုသည် ခေါင်းမနှင့် ဆက်ဆံခြင်း မပြုရခြင်းကြောင့် မျိုးပျက်ရလေသည်။ သိုးစဉ်မြေးဆက် ဤနည်းဖြင့်သာ ပြုကျင့်လာခြင်းကြောင့် ယနေ့ ခေါင်းဖိုသည် ဆန်ခါကျ မျိုးကောင်း ခေါင်းဖိုအဖြစ်ဖြင့် လှပသည်ထက် လှပနေသည်။

ခေါင်းဖို၏ လှပသောတောင်စံသည် အလှပြိုင်ပွဲ၏ ခလပ်ခြစ်ခြင်းကြောင့် ရည်းစားလှပွဲတွင် ထိုလှပသောတောင်ပံကို အစွမ်းကုန် ကားပြလေသည်။ ထိုကြောင့် “မနှင့်မြူဆွယ် ထောင်ကမ်းမှ၊ ညွတ်ကွင်းလှမ်း၍ တဖက်ခြေ။” ဟု ကဗျာဆရာများက ခေါင်းဖိုအချစ်ကြီးပုံကို စပ်ဆိုထားသည်။

ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် အနှစ် ၆၀ မြောက် ဖျော်ဘွဲ့ရွှင်ပွဲဆိုစာရေးသူ အားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ ခေါင်းငှက်ခြံတွင် ခေါင်းငှက်များကို ပိုင်းအုံကြည့်ရှုသည်။ ပရိသတ်ထဲတွင် ပါတိတ်ဖြင့် ဂါဝန်ချုပ်ဝတ်ထားသော ကျောင်းသူတစ်ဦးကို မြင်လျှင် ခေါင်းဖိုကြီးသည် လှပသော အတောင်ကြီးကို ကားပြလေတော့သည်။ ကျောင်းသူ ဝဲသွား၊ ခေါင်းဝဲလိုက်၊ ကျောင်းသူယာသွား၊ ခေါင်းယာလိုက်။ ဤသို့ဖြင့် ထိုလှပသော အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ကျောင်းသူနှင့် ခေါင်းဖိုတို့ အလှပြိုင်နေကြသေးသည်။ မနက်ဆိုး ကျောင်းသူထွက်ပြေး အရှုံးပေးခဲ့လေသည်။

၃၉။ ။ သာလိကာနှင့် ကြက်တူရွေး တို့သည် အဘယ်ကြောင့် လူစကားပြောတတ်သနည်း။

ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် ငှက်ပျောင်ခြံသို့ သင်ဖြတ်ကျော်သွားလျှင် ဆူညံသော ငှက်ပေါင်းစုံသံ ၎င်းတို့တွင် ‘ဘယ်သွားလေ’ ‘လာအုံး’ ‘ဘယ်နှစ်နာရီ ထိုးပြီလဲ’ ‘ဘမ်းစားပြီးပေး’



‘ဟဲ့ဟဲ့ ဟဲ့ဟဲ့’.....စသောအသံကို သင်ကြားမိလိမ့်မည်။ သင့်ကို နှုတ်ခွန်းဆက် ပြောင်လျှောင်နေသောသူသည် အခြားမဟုတ်။ ရှာမှရှားတဲ့ ငှက်လိမ္မာ သာလိကာနှင့် ကြက်တူရွေးဖြစ်သည်။

သာလိကာနှင့် ကြက်တူရွေးသည် အမှန်တကယ် လူကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော စကားကို ပြောနေခြင်းလော။ မဟုတ်ပါ။ ယင်းတို့တွင် ဘာသာစကားမရှိ။ ကံယံတိုင်လည်း စကားမပြောတတ်ပါ။ တခါတရံ လွယ်ကူသော စကားခွန်းများ ‘ပြောဆို’ ခြင်းမှာ လှသပ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အတုခိုးခြင်းတမျိုးဖြစ်သည်။ အိမ်တွင် ခွေးထားသော အခါသာ ထိုအခြေအနေ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ အရိုင်းကောင်များတွင် ထိုအရည်အချင်းများ တွေ့ရခဲသည်။

ဘာသာစကားသည် လူမှုဆက်ဆံရေး လိုအပ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရာဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို လူသားတို့ တဦးတည်း ပိုင်သည်။ အသံပေးကြောကို အားကိုး ရသည့်ပြင် အာခေါင်၊ လှာ၊ သွား၊ နှင့် နှုတ်ခမ်းတို့ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ ဦးနှောက်တွင် စဉ်းစားလားသော အရာကို ဘာသာစကားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။

အချို့ငှက်များ စကားပြောတတ်ခြင်းမှာ ယင်းတွင် သေးငယ်ပြီး ပျော့ပျောင်းသည့် အသွားများသာ သွန်သိုခြင်းကြောင့်ရင်း၊ လူတို့၏ အဆက်မပြတ် သင်ကြား လေ့ကျင့် ပေးမှုကြောင့်ရင်း၊ စကားလွယ် အနည်းငယ် ပြော တတ် သည်။ လေယူ လေလိမ်း သဘောလောက်သာ ဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေး ခက်ခဲသော စကားခွန်းများကို ထိုငှက်များ မပြောတတ်ပေ။ လူတို့၏ နီးနီးကပ်ကပ် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ လေ့ကျင့်ပေးမှုကြောင့် ယင်းတို့၏ အမူအယာများသည် လွယ်ကူသော ကန့်သတ်ချက်မဲ့ ပြန်ဟပ်ခြင်းမှ ကန့်သတ်ချက်ရှိ ပြန်ဟပ်ခြင်းသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားသည်။

လူတို့နှစ်ရှည်ကြာစွာ ဘာသာစကားရှိ အသံသွားဖြင့် ထိုငှက်များကို ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ‘အတုမြင် အဘတ်သင်’ ဟူသကဲ့သို့

အတုခိုးတတ်လေတော့သည်။ ထိုအခြင်းအရာကို ကန့်သတ်ချက်မဲ့ ပြန်ဟပ်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ နောက် လူတွေ့သောအခါ ယခင်သင်ကြားထားသော အသံသွားများဖြင့် ပြန်ပြောလေတော့သည်။ ထိုအခြင်းအရာကို ကန့်သတ်ချက်ရှိ ပြန်ဟပ်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။


တိရစ္ဆာန်လေတော့တွင် ငှက်မျိုးသာလျှင် မျိုးတူများ၏ အသံအခြား တိရစ္ဆာန် များ၏ အသံနှင့် တူရိယာ အသံများကို အတုခိုးနိုင်သည်။ လူစကားကို အတုခိုးနိုင်သော ငှက်များသည် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဥပမာ၊ သာလိကာ၊ ဆက်ရက်၊ ကြက်တူရွေး စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အချို့လူများသည် ထိုထိုသော အတုခိုးတတ်သည့် ငှက်များ၏ အတွင်းလွှာအရိုးကို ခားပြားလေးနှင့် ဖြတ်ပစ်သော် ရှုပ်ထွေးသော စကားခွန်းများကိုပင် အတုခိုးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

၄၀။ ။ကနောင်မင်းသားကို ခေါင်းကိုက်စေသော “ဥနှင့်ကြက်”

‘ဥနှင့်ကြက် ဘယ်ဟာ အရင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သလဲ’ ယောခင်းပြီးသည် ကနောင်မင်းနှင့် အလ္လာပ သလ္လာပ ပြောနေစဉ် ဤမေးခွန်းကိုမေးလိုက်သည်။ သိပ္ပံနှင့်စစ်ရေးပညာတွင် အထူးစိတ်ဝင်စားစွာ လေ့လာသော ကနောင်မင်းသားသည် မျက်လုံးသေပြီး အတန်ကြာ ငြိမ်သက်စွာစဉ်းစားသည်။ ပြီးနောက် နဖူးတွင် အရစ်ပေါ်လာသည်။ ပြီးနောက် ခေါင်းသုံးလေးကြိမ် မြှေးညှင်းစွာ ညိတ်သည်။ သို့သော်လည်း ယောမင်း၏ အမေးကိုမူ မဖြေကြားပဲနေသည်။

ထိုမေးခွန်းကို သိပ္ပံပညာကျော် ဆိုင်စတိုင်လည်း မဖြေကြား



နိုင်ခဲ့ချေ။ ယနေ့တိုင် လူအများသည် ထိုမေးခွန်းကို မှန်မှီမှန်ဝါး ဖြစ်နေကြသေးသည်။

ဥကို ကြက်အူသည်။ ကြက်သည် ဥ၏ထွက်ကုန်၊ ကြက် မရှိပဲ ကြက်ဥကို ဘယ်က ရမည်နည်း။ ဥမရှိပဲ ကြက်ကို ဘယ် က ပေါက်ဖွား လာမည်နည်း။ လွယ် မပောင်ယောင်နှင့် ခက် တိမ်မပောင်ယောင်နှင့် နက်နေသော မေးခွန်း။ သာမန်အားဖြင့် ထိုမေးခွန်းကို ရှင်းလင်းဖြေကြားရန် ခက်ခဲသည်။ သို့သော်လည်း သဘာဝရှိ အခြင်းအရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ပင်ကိုယ်အရာ ရှိစေခဲ့ဖြစ်သည်။

ဒါဖြင့် 'ဥနှင့်ကြက်' ပြဿနာကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ဤနေရာတွင် ကူနိပ်တို့ အတိအကျ ယူဆရမည်မှာ ဤပြဿနာ သည် ဟိရစ္ဆာန်အခြေပြောင်းအလဲ၏ သမိုင်းဝင်ပြဿနာ ဖြစ်သည်။

အိမ်ကြက်သည် ရှေးလခင်တောကြက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ် သည်။ ရှေးတောကြက်များကို လူများဖမ်းပြီး မွေးမြူထားခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲလာသည်။ ဤအယူအဆကိုမူ သတ္တပညာရှင် များ သံသယမရှိကြချေ။ ယနေ့တိုင် တောကြက်များ၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနှင့် မလေးရှား တောင်တန်း ဒေသများတွင် များစွာ ရှိနေ သေးသည်။ သို့သော်လည်း ထိုတောကြက်ဥကို ဖောက်လျှင် တော ကြက်ပဲ ပေါက်မည်။ အကြောင်းမှာ ထိုတောကြက်များသည် လူ တို့၏ မွေးမြူစောင့်ရှောက်ခြင်း မခံရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။


အိမ်ကြက်များနှင့် တောကြက်တို့ ခြားနားချက်မှာ အိမ်ကြက် တွင် အသားများ အဆီများသည့်ပြင် ဥပိုအုနိုင်သည်။ (တော ကြက်မှာ တနှစ်လျှင် ၁၀ လုံးသာအုနိုင်သည်။) နိုင်ငံခြားကြက် အများဆုံး ၃၆၀ လုံးအုနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ မျိုးကောင်းစွာခြင်း မှာ လူတို့၏ မွေးမြူရေး အခြေအနေက ဖန်တီးပေးသည်။ ထို ကြောင့် ယနေ့ အိမ်ကြက်များသည် တောကြက်မှ တခါတည်း ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပဲ နှစ်ချည်အဆက်မပြတ် တဖြေး ဖြေး ပြောင်းလဲလာသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။

အိမ်ကြက်သည် တောကြက်မှ ပြောင်း လဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထို 'ပြောင်းလဲ' ဟူသည့်ပြဿနာကို ပြီးစွာ စဉ်းစားရမည်။ အကြောင်းမှာ ထို 'ပြောင်းလဲ' မှုသည် အိမ်ကြက်ဖြစ် ပေါ်လာခြင်း၏ အခြေခံပြဿနာဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ပြောင်းလဲ ခြင်းကို ဥမှစမည်လော။ ကြက်မှစမည်လော။ မူကွဲအမေရာကြီး မက်ချူးလင်း၏ ထင်မြင်ချက်မှာ "သက်ရှိ-နား၏ ပြောင်းလဲခြင်းကို သက်ရှိများ၏ ကြီးထွားသောအဆင့်ကို အဓိကထား စဉ်းစားရ မည်။" ထိုကြောင့် ဩဇာ၏သမိုင်းအပြောင်းအလဲသည် ကြက်၏ ကြီးထွားသောအဆင့်ကို အခြေခံထား စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး ဥအ ဆင့်ကို အခြေခံထားပြီး စဉ်းစားအပ်။

ထိုကြောင့် အိမ်ကြက် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ပထမဦး ဆုံး လူတို့မွေးမြူသော ကြက်မှ စ ရမည်။ ပထမဦးဆုံး တော ကြက်မှ မစအင်။ ဒီလိုသည်မှာ ပထမဦးဆုံးတောကြက်မှ မဖောက် ရသောကြက်ကို လူတို့မွေးမြူ ပြုစုခြင်းဖြင့် အိမ်ကြက် ဖြစ်ပေါ်လာ ခြင်း မှစရမည်။ ပထမဦးဆုံး တောကြက်ဥမှ အဆင့်တင်ပြောင်းလဲ ခြင်း ဖြစ်ပြီး အိမ်ကြက်ပေါက်စွားလာသည့် ဆုံးခြင်းမှ မစအပ်ချေ။ ထိုကြောင့် အိမ်ကြက်အဖြစ် ပထမဦးပေါ်ပေါက်ပြီးမှ အိမ်ကြက် ဥ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်လည်း ပထမဦးဆုံး တောကြက်မှ ပြောင်းလဲလာသော အိမ်ကြက်သည် အပြောင်း အလဲ အနည်း ငယ်သာ ရှိမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲချေ။

ဤသို့ဖြစ်လျှင် တောကြက်ကော ဘယ်ကဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ ငှက်မျိုးသည် နှစ်ပေါင်းကုဋေမျှ ရှေးကဲ့သော 'ဘိုးဘေး ဘီဘင် ငှက်ဥ' မှ ပေါက်ဖွားလာသော ငှက်ငယ်များ၊ နှစ်ရှည် ပြောင်း လဲခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ 'ဘိုးဘေးဘီဘင်ငှက်' သည် ရှေးကျသော တွားသွားပိုးကောင်ဥမှ ပေါက်ဖွားလာသော သက် ရှိငယ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ရှေးကျသော တွားသွားပိုးကောင်များသည် ပို၍ ရှေးကျသော



ဝတ္ထုမှ နှစ်ရှည် ပြောင်းလဲခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် လူဦး သင် ဂရုပြုရမည့်အချက်မှာ 'ဥ'သည် သတ္တဝါ အသက် ၏ နိဒါန်းဖြစ်သော်လည်း သတ္တဝါ 'မျိုးသစ်'၏ နိဒါန်းမဟုတ် ချေ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာမှန်သမျှသည် ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲ ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲ သို့ ရောက်သွားခြင်း မဟုတ်ပေ။

သက်ရှိလောကဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ငြင်းခမ်းသော် ရှေးကျသော 'အခဲဆဲလ်' ဦးစွာရှိရမည်။ ထိုမှ 'သားဆဲလ်' နှင့် 'မျိုးဆဲလ်' တို့ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ သဘာဝလောကတွင် 'မိခင်' ရှိပြီးမှ 'သား' ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သားအရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှ မိခင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မဖြစ်နိုင်ချေ။ ထိုကြောင့် ကနောင်မင်းသားကို ခေါင်းကိုက်စေ သော 'ဥနှင့်ကြက်' မေးခွန်းကို ဖြေရသော် မိခင်ဖြစ်သည့် ကြက် သည် သားဖြစ်သည့် ဥထက် အရင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သို့မှသာ သဘာဝဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်မည်။

၄၁။ ။ ကြက်မများ အဘယ်ကြောင့် အချိန်မှန် ဝင်ကြသလဲ


ကြက်များသည် ဝက်များကဲ့သို့ပင် ဖျင်းရိခြင်းမရှိပဲ နေ့စဉ် ကြီး ကြီးစားစား အစာရှာ စားလေ့ရှိသည်။ ကြက်များ အလုပ်ကြီး ပေးသော်လည်း တခါတရံ ကြက်မများသည် 'ဖျင်းရိ' တတ်သည်။ စားပြီးအိပ်၊ အိပ်ပြီးစား ပြုလုပ် နေသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သူ့အိပ်နေသော နေရာသို့ ရောက်သွားလျှင် တဂဂနှင့် အော်သည်။ သင့်ကို ထကိုက်တော့မည်၊ အမှုအယာပြုလိမ့်မည်။ ထိုအခြင်းအရာ ကို ကြက်မဝပ်ခြင်း ဟု ခေါ်သည်။

ကြက်မများ အဘယ်ကြောင့် ဝင်ရသနည်း.....။

သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ စူးစမ်းလေ့လာချက်အရ ကြက်သည် ဥ ၁၀ လုံးကျော် အပြီးသောအခါ 'ဦးနှောက်အောက်ရှိ ဂလင်း' ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ထိုဂလင်းသည် ကြက်၏ ကိုယ်အင်္ဂါများကို များစွာပြောင်းလဲစေသည်။ စိတ်ကို ငြိမ်သက်စေသည်။ 'သတိ' ကြီးလာစေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း သွေးစီးနှုန်းသည် မြန်လာ သည်။ ကိုယ်အပူချိန် မြင့်တက်လာသည်။ ရင်အုပ်ပိုင်းနှင့် ဝမ်း ပိုက်ပိုင်းတွင် အမွှေးလျော့နည်းလာသည်။ ထိုအခါ ကြက်အိမ် တွင် ကြက်ဥထည့်ထားလျှင် ထိုကြက်မသည် မိဒိ၏ သားသမီးကို ပြုစုသကဲ့သို့ ပြုစုလိမ့်မည်။ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ် ကောင်းသည်မှာ ထိုဂလင်းမျှကိုးကြက်ဖန်ကိုယ်တွင်းသို့ ထိုးပေးသောအခါ ကြက်မ သည်လည်း ကြက်မကဲ့သို့ ဝပ်ဘော့သည်။ ထိုဂလင်းများ ဖြစ်ပေါ် သာရခြင်းသည် ဥအနည်းအများ အခြင်းနှင့် သက်ဆိုင် ဆက်စပ် နေသည်။ ရာသီဥတုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ များသောအား ဖြင့် နွေကုနှင့် မိုးရာသီတွင် ဝပ်ကြသည်။

ကြက်မတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝပ်ခြင်း စွမ်းအင်မှာလည်း နှစ်ရှည် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဘက် ပညာ စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။

အာရှတိုက်သားတို့သည် ရှေးအခါမှစ၍ ကြက်မဝပ်ခြင်းကို အသုံးပြုပြီး ကြက်မျိုးပွားအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ကြက်မများ ဝပ်စဉ် အာဟာရများစွာ ကုန်ခန်းခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဥအခြင်းကို ထိခိုက်စေသည်။ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် လောက်ကပင် လူသားတို့သည် ကြက်မဝပ်ပုံကို အတုခိုးပြီး ရွှံ့မီး ပိုဖြင့် ကြက်ဥဖောက်သည်။ ယခုမှ ဓာတ်ဖြင့် ဖောက်ကြလေပြီ။ ထိုကြောင့် ကြက်ဥကို စက်နှင့် ဖောက်နိုင်ပြီဖြစ်၍ ကြက်မများ ဝပ် ခြင်းကြောင့် အင်အားလျော့ခြင်း၊ ဥအုလျော့ခြင်းများကို ကာကွယ် ရန် ဝပ်ချိန်တွင် နိုးကြွအောင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်နည်းမှာ ဝပ်ချင်သောကြက်မကို ဝါးလှောင်အိမ်တွင် ထည့်ပြီး လေဟိုက်သော အေးသည့်နေရာတွင်ထားပါ။ ဤသို့ နှစ်ရက်သုံးရက် မှထားလျှင်



ဝပ်ချင်စိတ် ကုန်သွားပေးလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ဥပြန်လည် အုန်းလိမ့်မည်။

၎င်းမျိုးသည်လည်း ကြက်မကဲ့သို့ ဥအကန့်အသတ် အပြားသော အခါ ဝပ်ကြသည်။ ခိုငှက်သည် ဥနှစ်လုံးအပြားတိုင်း ဝပ်လေ့ရှိသည်။ ဥဖောက်ချိန်တွင် ခိုရိနှင့် ခိုမတလှည့်စီဝပ်ခြင်း တာဝန် ယူကြသည်။ နံနက်မှ ညနေထိ ခိုစိတ်တာဝန်၊ ညနေမှ နောက်နေ့ မိုးလင်းထိ ခိုမတ်တာဝန်။ ဤသို့ဖြင့် ညီညွတ်စွာ မျိုးပွား လုပ်ငန်း လုပ်ကြသည်။

၄၂။ ။ ကြက်မများ အပြားသော အခါ အဘယ်ကြောင့် တ'ဂို့ဂို့-ဂို့ဂို့' အော်ရသနည်း

ကြက်မများ အပြားသောအခါ တဂို့ဂို့ အသံထွက် အော်ရသည်။ သို့သော်လည်း အချို့ဥအုန်းများသော ကြက်မများမှ မအော်ကြချေ။

ကြက်မများ ဥအုပြီး တ'ဂို့ဂို့' အော်ခြင်းမှာ မိခင်ဖြစ်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူ ဝါကြွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကြက်မကို အချက်ပေးခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

ကြက်မတကောင် ဥာလုံးအုရန် လွယ်သော အလုပ် မဟုတ်ချေ။ အထူးသဖြင့် အမိစိတ် မြင့်မားသော ကြက်မများသည် ကြာရှည်စွာ ဝပ်ပြီးမှ ဥထွက်လာသည်။ သေဘုယျအားဖြင့် အတိုဆုံး အချိန်မှာ ၁၀ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာရှည်သော ကြက်မှာ ၄ နာရီမှ ၅ နာရီထိကြာသည်။

ကြက်အိမ်ထဲသို့ ဝင်ဝင်ခြင်း ကြက်မကို သင်သွား ဖမ်းလှင် ချက်ခြင်း ထပြေးလိမ့်မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ။ သို့သော်လည်း အတန်ကြာ ဝပ်နေပြီးသောအခါ သင်သွားဖမ်းလှင် သင့်လက်ကို နှုတ်သီးဖြင့် ပေါက်သော်လည်း ထမပြေးတော့ချေ။


ထိုအချိန်တွင် ကြက်ဥသည် စအိုဝသို့ ရောက်နေပြီး အနေအထား လှည့်ခြင်းပြုလုပ်နေသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်သည် ကြက်မ အာရုံစူးစိုက်ပြီး ဥအုနေသော အချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ တလုံးအုရန်အတွက် အင်အားများစွာ ကုန်ဆုံးရသည်။

ထိုကြောင့် ကြက်မများ အပြားသောအခါ အတန်ကြာ အနားယူပြီးမှ ထလာသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကြက်မ၏ စိတ်ဓာတ်ရှင်လန်းနေခြင်းကြောင့် တဂို့ဂို့နှင့် အော်နေသည်။ ယင်း အော်သံသည် မိခင်၏ ကြားဝါခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ် ခင်ပွန်းကို အချက်ပေးအကြောင်း ကြားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

သင် ကြက်ခြံသို့ သွားရောက်လေ့လာလျှင် ကြက်အုနေသော အချိန်တွင် ကြက်မသည် အပေါက်ဝ၌ စောင့်နေသည်ကို အမြဲတွေ့ရမည်။ ကြက်မအုပြီး တဂို့ဂို့နှင့် အော်ဆင်းလာသော အခါ ကြက်မသည် မျိုးစပ်ရန် သွားရောက်ခေါ်ဆောင်လိမ့်မည်။ စူးစမ်းလေ့လာချက်အရ ထိုအချိန်တွင် မျိုးစပ်လျှင် နောက်တရက်ခြားအုသော ဥသည် ကြက်ငယ်ဖောက်ရန် အောင်မြင်သော ဥဖြစ်လိမ့်မည်။

၄၃။ ။ 'မျက်နှာ' နိသော ကြက်မသည် ဥအုလိမ့်မည်ဟု ဆိုရိုးကော၊ ရှိသည်။ အဘယ် သို့သော အဓိပ္ပာယ်နည်း

တခါတုန်းက ပုသိမ်မှ ရေကြည်ရွာရှိ ဖွားဖွားထံ အလည်သွားခဲ့သည်။ 'သည်ကြက်မဥအုလိမ့်မည်။ ဟိုကြက်မတော့ အုမှာ မဟုတ်ဖူး' ဟုဖွားဖွားဘို့ ခြံဘေးတွင် နေသော လယ်သမားနှီးငါးဦးချစ်က ဖွားဖွားတို့အိမ်သို့ ကြက်မနှစ်ကောင်ကို ဤသို့ဟောကြား ထုတ်သွားသည်။ ဤချစ်ကား လယ်ယာလုပ်သက် အနှစ် ၃၁ ရှိပြီ ဖြစ်သော လယ်ယာဦးကြီးဖြစ်သည်။ ထိုအနှစ် ၃၀ အတွင်း လယ်



စိုက်ယင်း ဝင်ငွေပိုရရန် ကြက်မွေးမြူရေးလည်း လုပ်သည်။ ထိုကြောင့် စာတလုံးမျှ မတတ်သော်လည်း အတွေ့အကြုံကပညာ ဖြစ်နေလေပြီ။ ဦးချစ်၏ ဟောနည်းမှာ ကြက်မ၏ 'မျက်နှာ' နိဂုံးခြင်း ရှိ မရှိကို ကြည့်ပြီး ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်လည်းအတိအကျ မှန်ကန်ပါသည်။

'မျက်နှာ' နိဂုံးသော ကြက်မကို ဥအုနိုင်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ဆိုနိုင်သနည်း။ အဖြစ်ပျက်ကား ဤသို့တည်း...။ ကြက်မ၏ 'မျက်နှာ' ပိုင်းသည် အခြားအပိုင်း၏ အရေခွံနှင့်မတူချေ။ 'မျက်နှာ' အပိုင်း၏အောက်တွင် သွေးကြောများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ဥမအုသော အချိန်တွင် 'မျက်နှာ' ပိုင်း၏ သွေးများ လှည့်လည်ခြင်း မပြင်းထန်ခြင်းကြောင့် အနည်းငယ် ခြောက်သွေ့နေသည်။ ကြက်အုသောအခါ 'မျက်နှာ' ပိုင်း အရေခွံနှင့် ကြက်အမောက်သည် အတွင်းပိုင်း ဆွေခတ်ကြောင့် သွေးလှည့်လည်နှုန်း မြန်လာပြီး အမောက်လည်း ကြီးလာသည်။ 'မျက်နှာ' ပိုင်းသည်လည်း တင်းလာပြီး နီနေသည်။ မျိုးဆက်များစွာကို လေ့လာချက်အရ ကြက်မ၏ 'မျက်နှာ' နိဂုံးခြင်းသည် ဝမ်းပိုက်တွင် ဥစတင်ဖြစ်နေသော အချိန် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကြောင့် ကြက်မ 'မျက်နှာ' နိဂုံးခြင်းသည် မျိုးပွားခြင်းအဖွဲ့တို့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နေကြောင်း ဖော်ပြသည်။ မြို့နေသော 'မျက်နှာ' နိဂုံးလာသော အခါ ဥအုတော့မည်ဟု သိရသည်။

သို့သော်လည်း အချို့ကြက်မများ၏ မျက်နှာမှာ မနီတတ်ပဲ ဥအုမြဲ အုနေသည်ကို တွေ့ရတတ်သည်။ ဤအခြင်း အရာ များကို ဥများစွာအုပြီးသော ကြက်မများတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ ထိုကြက်မသည် အသက်ကြီးရင့်၍ အေးအင်လျော့ပန်းနေပြီဖြစ်သည်။


၄၄။ «ဆောင်းရာသီတွင် ကြက်မများကို လျှပ်စစ်မီးရောင်ထိုးပေးလျှင် ဥပိုအုသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

လွန်ခဲ့သောနှစ် ဆောင်းရာသီတွင် စာရေးသူသည် ပုသိမ်သို့ပြန်ရာ ကိုကျော်နိုင်၏ ကြက်ခြံကို လေ့လာခွင့် ရခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်မီးသီးများကို ကြက်အိမ်တိုင်းတွင် လင်းထိန်စွာ ထွန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မေးကြည့်သော် 'ဥပိုအုရန်' ဟု ဖြေသည်။ 'အဘယ်ကြောင့်နည်း' ဟု မေးသော် သူလည်းမဖြေတတ် ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ဥပိုအုသည်တော့ အမှန်ပဲဟု ဖြေသည်။

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရ ကိုကျော်နိုင် မဖြေနိုင်သည့် မေးခွန်းကို ဘီအက်စီ သိပ္ပံဘွဲ့ရ စာရေးသူ ဖြေတတ်ရပေမည်။ အကြောင်းမှာ ဤမေးခွန်းမျိုးသည် သိပ္ပံမေးခွန်း ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။

ဆောင်းရာသီတွင် ကြက်မများ ဥအုနှုန်း ကျဆင်းသည်။ အချို့လူတို့၏ ယူဆချက်မှာ ရာသီဥတု အေးသောကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကြောင့် ကြက်မကို နွေးသောနေရာတွင် ထားပြီး အစာများ များ ကျွေးကြသည်။ အချို့များ မီးဖိုဘေးတွင် ထားသည်။ သို့သော်လည်း အုနှုန်း ကျမြီကျနေသည်။

ထိုပဟေဠိကို ၁၈ ရာစုကုန်ခါနီးနှင့် ၁၉ ရာစုအစကုမှ ဖြေရှင်းနိုင်တော့သည်။ အဖြစ်ပျက်ကား ဆောင်းရာသီတွင် နေ့တာတိုပြီး ညတာရှည်ခြင်းကြောင့် ကြက်ကို နွေးသော အိမ်ခန်းတွင် ထားသော်လည်း လိုအပ်သော အလင်းတန်း ဆွပေးခြင်း မရှိသောကြောင့် ကြက်သည် ဥများစွာ မအုနိုင်ချေ။ ထိုကြောင့် ညက်တတ်မြက်သော လူသားတို့သည် နေ့တာရှည်ပေးရန် လျှပ်စစ် အလင်းရောင်ထိုးပေးခြင်းဖြင့် ဥပိုအုစေသည်။



အဘယ်ကြောင့် လျှပ်စစ်မီးရောင် ထိုးပြီးသော ကြက်မသည် ဥပိုအုနိုင်သနည်း။ လေ့လာချက်မှ ရရှိသောအဆိုမှာ အဆင်းတန်းသည် ကြက်မပျက်စေ့ကို ဖြတ်ပြီး ဦးနှောက်အောက်ရှိ ဂလင်းရွက်ကို ဆွပေးသည်။ ဂလင်းရွက်မှ စိတ်ထ ဓာတ်တမျိုး ပွားထွက်လာသည်။ ထိုဓာတ်သည် ဥအိမ်ကို ဆွပေးခြင်းကြောင့် ဥများ ပိုအုစေသည်။

အထက်ပါ ယူဆချက်အရ ယနေ့ 'လျှပ်တပြက်မီးရောင်နည်း' ကို အသုံးပြုကြသည်။ ၁၅၀၀၀ တိုင်အားရှိ မီးလုံးကို ၃၀ စတုရန်းမီတာရှိ မြေမျက်နှာပြင်တွင် ထွန်းထားသည်။ နံနက် ၄ နာရီ တကြိမ် ၂၀ စက္ကန့်ခန့် ၅ နာရီ တကြိမ်၊ ၂၀ စက္ကန့်ခန့် ထိုးပေးသည်။ ရလက်ကား ကြာရှည်ထိုးပေးခြင်းနှင့် တူညီသည်။

လျှပ်စစ်မီး ထိုးပြီးသော ကြက်သည် မီးထိုးပြီး နှစ်ပတ်မှတလအကြာတွင် ဥအုနှုန်း တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မှန်မှန်တက်သည်။ တလခွဲမှ နှစ်လထိ နှုန်းအမြင့်ဆုံး ရောက်သည်။ မီးမထိုးသော ကြက်ထက် နှစ်ဆမျှ ပိုအုသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် နှုန်းပြန်ကျလာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မီးထိုးပေးခြင်းကြောင့် ဖုမ်းမှုခြင်း ၁၀% ထိုးအုသည်။


၄၅။ ကြက်မပျိုကို မွေးခြင်သည် ကြက်မအိုကို မွေးခြင်းထက် ဝိ၍ တွက်ခြေကိုက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ပုသိမ်ခရိုင် ရေကြည်ရွာတွင် နေသော ဖွားစွာသည် တနှစ်တကြိမ် အလှူအဘန်း မှန်မှန်လုပ်လေ့ ရှိသည်။ အလှူလုပ်သောအခါ ကြက်ဝယ်လေ့ မရှိပဲ ဖြစ်၍ ကြက်မအိုများကိုသာ ဟင်းချက်လေ့ ရှိသည်။ ကြက်မပျိုများကိုမူ လက်ဖျားနှင့်ပင် ၂ မဘိုချေ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း။

အကြောင်းကား ကြက်မပျိုကို မွေးခြင်းသည် ကြက်မအိုကို မွေးခြင်းထက် ပို၍ တွက်ခြေကိုက်သည်။ ကြက်မပျိုဟူသည်မှာ ထိုနှစ်တွင် ကြီးပြင်း ထိုနှစ်တွင် ဥအုသော ကြက်ကိုခေါ်သည်။ ကြက်မအိုဟူသည်မှာ ဥတနှစ်အုပြီး အသက်နှစ်နှစ်ရှိ ကြက် ကိုခေါ်သည်။ ထိုကြက်နှစ်မျိုး အသက်တနှစ်သာ ကွာခြားသော်လည်း ခြားနားခြင်းကား ကြီးမားလှသည်။ ကြက်မွေးမြူရေးပါရဂူများ၏ လေ့လာချက်အရ ကြက်မတကောင်သည် ပထမနှစ်တွင် ဥ ၁၀၀၀ အုလျှင် ဒုတိယနှစ်တွင် ဥ ၂၀၀ မှ ၅ လုံးသာ အုတော့သည်။ တတိယနှစ်တွင် စတုတ္ထနှစ်တွင် ပို၍ လျော့ကျသည်။ (အထူးသဖြင့်) ပထမနှစ် ဥအုရေအတွက်နည်းသော ကြက်မသည် ပို၍ ကွာခြားသည်။ ကြက်မတွင် အဆီ စုဆောင်းသော သဘာဝ စွမ်းရည်ရှိသည်။ သင်သေချာ ဂရုပြုပြီး လေ့လာလျှင် ကြက်မအို၏ ဝမ်းပိုက်ပိုင်းတွင် အဆီများသည် ကြက်မပျိုထက်များသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆီများသောအခါ ဂလင်းယှပ်ရှားမှ စွမ်းရည်လည်း လျော့ကျသွားလိမ့်မည်။ ဥအုနှုန်းလည်း ကျဆင်းတော့သည်။

တဖန် ကြက်မအို စားသုံးသော အစာသည် ကြက်မပျိုထက် များသည်။ ကြက်မတကောင်စားသော အစာသည် ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျသည်။ ကိုယ်ချိန်လေးလေးလေး၊ အစာကုန်လေလေဖြစ်သည်။ သက်တမ်းနှစ်နှစ်ရှိသော ကြက်သည် သက်တမ်းတနှစ်ရှိလျှင်ကထက် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅% မှ ၂၀% ခန့် ပို၍ လေးသည်။ ၎င်းပြင် နှစ်နှစ်အထက် ကြက်၏ ကိုယ်အလေးချိန်သည် မတိုးတော့ပေ။ တိုးလျှင်လည်း အကန့်အသတ် ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ကြက်မပျိုမှာမူကား ဥအုချိန်တွင် ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းငယ် လျော့ကျပြီး ကြီးထွားမှုကား မရပ်ချေ။ ဥလျော့အုသော အခါမှသာ လျှင်ကိုယ်အလေးချိန် တိုးတက်မည်။

ထို့ကြောင့် ဖွားစွာသည် ကြက်မပျိုကို ချန်လှပ်ထားပြီး ကြက်မအိုကို ချက်စားခြင်းဖြစ်သည်။



၄၆။ «ကြက်မများ၊ ပိုးကောင်များများစားလေ၊ ဥများများအလေ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ကြက်ဥကို လူတိုင်း နှစ်သက်သည်။ ကြက်ဥသည် အာဟာရဓာတ်ဖြင့် ပြည့်ဝသည်။ ကြက်ဥ၏ အဝါရောင်အနှစ်တွင် အဖိုးတန်သော အားဆေး ဖြစ်သည့် ဗေဒနာဗေဒဓာတ်အပြင် အခြားသောဓာတ်များ၊ ဗီတာမင်ဓာတ်များ ပါဝင်သည်။ ကြက်ဥတလုံးတွင်ပါဝင်သော ဗီတာမင်အနှင့် ဗီဇာတ်သည် နွားနို့ပေါင်ဝက်တွင် ပါဝင်သည်ထက် ပိုမိုများသည်။

ဤအာဟာရဓာတ် ပြည့်စုံသော ကြက်ဥကို များများစားချင်လျှင် ကြက်မကို များများအုခိုင်းရမည်။

ကြက်မွေးမြူရေး ပါရဂူများသည် ကြက်ကို ကျွမ်းကျင်သည့် လူတိုင်း အစာရှာစားစေသည်။ ငြီးနောက် ဖမ်းပြီး ခွဲစိတ် ကြည့်သောအခါ ယင်း၏အစာအိမ်တွင် မြက်၊ ကောက်ပဲသီးနှံစေ့နှင့် ပိုးကောင်အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရသည်။

ကြက်မများ အဘယ်ကြောင့် ပိုးကောင်ကို နှစ်သက်သနည်း။ ဤအခြင်းအရာသည် ကြက်ဥအုခိုင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသလော။ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပိုးကောင်နီတမျိုးကို စစ်ဆေးသောအခါ ယင်းတွင် ပရိုတင်းဓာတ် ၄၀% ပါကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကြက်မများ ဥဖြစ်ရန် ပရိုတင်းဓာတ် အစာများ စွဲလိုသည်။ သာမန်ကြက်မများသည် တနေ့လျှင် ပရိုတင်းဓာတ် ၄ ဂရမ်မျှ လိုသည်။ ဥတလုံးခုရန် မှ ၇ ဂရမ်လိုအပ်ချေသည်။ ၎င်းပြင် မွေးမြူစာတွင် ပရိုတင်းဓာတ်များ မလုံလောက်ချေ။ ထို့ကြောင့် နွေရာသီတွင် ကြက်မများကို လှူငွေ ပိုးကောင်ရှာစားစေကာ အကျိုးရှိသည်။ ဥပိုအုခိုင်းသည်။


တစ်ကြက်တေကောင်သည် ဥတလုံးဖြစ်မြောက်ရန် အတွက် ဗီတာမင်ဓာတ်နှင့် သတ္တုဓာတ်လည်း လိုအပ်သည်။ ဥပမာကယ်လဆီယမ် ဗေဒနာဗေဒဓာတ်တို့သည် အကဲနှင့် အနှစ်တို့တွင် အဓိကပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးအစာတွင် (ပိုးကောင်မှအပ) ထိုဓာတ်များ ပါဝင်စေသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြက်မများ ပိုးကောင်များများ စားလေလေ၊ ဥများများအလေလေ ဟု ပြောဆိုကြခြင်းဖြစ်သည်။

၄၇။ «ကြက်ငယ်များ ဥပဒေရေးရာ ဖောက်ထွက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် အစာ စားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

အိမ်ကြက်၏ ဘိုးဘေးဘီဘင်သည် တောကြက်ရိုင်း ဖြစ်သည်။ ရေငါးပင်ပင် ပေါ်ဇီကပင် အိမ်ငယ်ပြည်မှ စတင်မျိုးပွားလာပြီးနောက် အမျိုးအစားများစွာ ပွား၍လာသည်။ ဥပမာ အသားစားကြက်၊ ဥစားကြက်၊ တိုက်ကြက် စသည်တို့ ခွဲခြားလာတော့သည်။

ငှက်မျိုးတွင် စောစွာ ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့် နောက်ကျ ရင့်ကျက်ခြင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိသည်။

‘နောက်ကျ ရင့်ကျက်ခြင်း’ သည် များသောအားဖြင့် ပျံနိုင်သော ငှက်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပြီး ဖောက်စ မွေးစတွင် ခေါင်းပြောင်၊ ကိုယ်ပျော့ပြီး မျက်စေ့ဖွင့်မရပဲ ဖြစ်နေသေးသည်။ အဓိငှက်မ၏ ကျွေးမွေး ပြုစုခြင်းဖြင့် ကြီးထွားလာပြီး အပျံသင်ခြင်း၊ အစာရှာ သင်ခြင်းများလည်း ငှက်မကြီးပဲ သင်ပေးရသည်။ ဥပမာ ကျီး၊ စာကလေး၊ ပျံလွှား စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကြက်ငယ်မူကား ဥပဒေရေးရာ ဖောက်ထွက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိဖာသာ အစာ စားနိုင်လေပြီ။ ထိုအမျိုးအစားငှက်သည် ‘စော





စွာရင့်ကျက်ငှက်များ ဖြစ်သည်။ စောစွာရင့်ကျက်သော ငှက်များ သည် ယေဘုယျအားဖြင့် မြေခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ရေငှက်ခြင်းများ ကို နှစ်သက်ကြသည်။ ဥအကာမှ ထွက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် မှက်စေ့အလင်းရောင်မြင်နိုင်ပြီး အတောင်အမွှေး စုံလင်လှပသည်။ မိမိဖာသာ ရေကူးနိုင် ဆော့နိုင်သည်။ မိခင်နှင့်အတူ အစာရှာ ထွက်သည်။

အဘယ်ကြောင့် ဥအကာမှ ထွက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် မိခင် နောက်လိုက်ပြီး အစာရှာနိုင်သနည်း။ သမိုင်းအကြောင်းအရာများ စွာ ပါဝင်သည်။

စောစွာရင့်ကျက်သော ငှက်မျိုးသည် အသိုက်ကို မြေပေါ်တွင် ၎င်း၊ ရေပေါ်တွင် ၎င်း ဆောက်ထားလေ့ရှိသည်။ ဤသို့ဆောက် ထားခြင်းဖြင့် သစ်ပင်ပေါ်တွင် ဆောက်ထားခြင်းထက် လုံခြုံမှု မရှိ ချေ။ ရန်သူတိုက်ခိုက်ခြင်းကို ပိုခံရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အခြေ အနေသည် ထိုငှက်မျိုးများကို စောစွာရင့်ကျက် ကြီးထွားအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနေသည်။ ရန်သူနှင့် ဆုံမိသောအခါ ဥကဲ့သို့က ပျက်ဖြစ်ပြီး သားတခြား အမိဘခြား ဖြစ်ခဲ့လျှင် မိမိဖာသာ အစာ ရှာခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မှသာ အသက် ရှင်မည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝက အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဖန်တီးထားသည်။


အိမ်ကြက်သည် တောကြက်နှင့် မြှောင်သံလာခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ကြက်သည် လူတို့၏မွေးမြူ ပြုစုခြင်းကို ခံရခြင်းကြောင့် တော ကြက်ဘဝမှာကဲ့သို့ ဘေးအန္တရာယ် မများတော့ချေ။ သို့သော် လည်း မျိုးဆက်၏ကိုယ်ပေါ်တွင် မျိုးရိုး၏ ထူးခြားသော အနာများ ကျန်ရစ်ဖော်ပြနေသေးသည်။ ကြက်ငယ်များ ဥအကာကို ဖောက် ထွက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် အစာစားနိုင်ခြင်းမှာ ထိုမျိုးရိုး၏ ထူးခြားချက် ကျန်ရစ်ခြင်းကို ဖော်ပြသည်။

၄၈။ ။ ဝမ်းဘဲများ ဥမဖောက်တတ်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ဝမ်းဘဲငယ်တဖန် ရေကန်၏ အလယ်တွင် ပျော်ခွင်မျှားတူးစွာ ရေကစားနေသည်။ ထိုဝမ်းဘဲငယ်များကို ဝမ်းဘဲမကြီးက ဝပ်၍ ဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲ ကြက်မ (သို့) စက်ဖြင့် ဖောက်ခြင်းမှ ရရှိ သော ဝမ်းဘဲငယ်များဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုက သင် ရုတ်ဘရက် အံ့အားသင့် နေလိမ့်မည်။ ဝမ်းဘဲမသည် ဥမဖောက် တတ်ခြင်းမှာ အမှန်ပင် ရှင်းပြပါအံ့။

ဝမ်းဘဲတွင် တောဝမ်းဘဲ (ဘဲရိုင်း) နှင့် ခြံဝမ်းဘဲ (အိမ်ဘဲ) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ တောဝမ်းဘဲတွင် အမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိ သည်။ ခေါင်းစိမ်းဝမ်းဘဲ၊ မြီးချွန်ဝမ်းဘဲ၊ ကိုယ်ကြားဝမ်းဘဲ စသည် တို့ရှိသည်။ ယင်းတို့ကို ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြား တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် လည်း ဆိုက်ဘေးရီးယားတွင်သာ မျိုးပွားသည်။ နှစ်စဉ် ဒဗြိလ နှင့် ဖွန်လတွင် ရေစပ်နားတွင် ပေါက်နေသော မြက်တောတွင် ၎င်း၊ မြို့ပေါက်တွင် ၎င်း သစ်ပင်မြောက် အခေါင်းတွင် ၎င်း အိမ်ဆောက် ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တကြိမ်သာ အုသည်။ တခါ အု လျှင် ၃ လုံးမှ ၁၂ လုံးထိ ဖြစ်သည်။

ရန်သူ၏ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသောအခါ မြင့်သော နေရာတွင် တပ်မိ အသိုက်ဆောက်ပြီး ဥအုပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဥဘာလုံးရဘို့ အခန်း ကာလကြာမြင့်စွာသည်။ မိုးရာသီတွင် ဆိုက်ဘေးရီးယားမှ မွေး သောဒေသသို့ ပြောင်းကြသည်။ နောက်နှစ် မွေးရီးရာသီ ရောက် တောမှ ဆိုက်ဘေးရီးယားသို့ ပြန်ပြောင်း သွားတတ်ပြန်သည်။ ခြံဝမ်းဘဲ၏ အမျိုးအစား အလွန်များသည်။ ခြံဝမ်းဘဲသည်



တောဝမ်းတဲ့ အထူးသဖြင့် ခေါင်းစင်းဝမ်းတဲ့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း မှ ရလာသော ဝမ်းတဲ့ဖြစ်သည်။ လူသားထို၏ နှစ်ရှည် လကြာ မွေးမြူ ပြုစုခြင်းခံရသောကြောင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း အလေ့ အကျင့်နှင့် အသိုက်ဆောက် ဥဇောက်သောစွမ်းရည်များပျောက် ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ခြံဝမ်းတဲ့များ ဥမဖောက်တတ် ခြင်းမှာ လူထို၏ ပယောဂကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဥဖောက်စွမ်းရည် မြင့်မားသော ကြက်တဲများသည် ဥအစွမ်းရည်နိမ့်သည်။ ဝမ်းတဲ့ကို မွေးမြူခြင်းမှာ အသားစား၊ ဥစားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လိုရာ ထိန်းသိမ်း၊ လေ့ရာပယ် ဟူသည့် ဝါဒလမ်းစဉ် အတိုင်း ဝမ်းတဲ့ များကို ရွေးချယ်မွေးမြူခြင်းကြောင့် ဝမ်းတဲ့များ ဥအဖျား ဥမဖောက် တတ် ဖြစ်နေတော့သည်။ ဝမ်းတဲ့ပင် မဟုတ်သေး။ ဥအတွက် သက်သက် မွေးထားသော နိုင်ငံခြားကြက်လည်း ဥမဖောက် တတ်ချေ။

၄၉။ ။ ခွေးက အမဲရိုးစား၊ ကြောင်များက ငါးရိုးစားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

အကယ်၍ သင့်ကို ထိုတဦးဘယောက်က ဆိတ်နှင့်ယုန် အရိုး လုစားနေကြသည် ဟုပြောက သင်အံ့အားသင့်ပြီး ပြေးလိုက်ကြည့် မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွှဲဖြစ်မည်။ သို့သော်လည်း သင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေ့စဉ် မြင်ရသော ခွေးများ အရိုးစားခြင်း၊ ကြောင်များ ငါးရိုးစားခြင်းကို သင် အဘယ်ကြောင့် မအံ့ဩ၊ စောဒက မတက်ပဲ နေပါသနည်း။ လူများသည် မိမိပတ်ဝန်း ကျင်မှ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်များကို မေးခွန်းမထုတ်ပဲ 'ဒါသာဘဝ အလျောက်မို့ သည်လိုဖြစ်ရတာပဲ' ဟူ၍ သဘောထားလေ့ ရှိ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။


'ဒါ သူ့အလိုအလျောက် ဖြစ်တာပဲ...'  
ဤအဖြေမျိုးကို မည်သူမျှ ကျေနပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ခွေးနှင့်ကြောင် အရိုးစားနိုင်ခြင်းမှာ ယင်းဘို့တွင် ဆိတ်နှင့် ယုန်တို့နှင့် မဟူသော 'အစာချက်စက်ရုံ' ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခွေးနှင့်ကြောင်တို့၏ 'အစာချက်စက်ရုံ' ရှိ 'စက်ခန်း'များကို ကြည့်ရှုလေ့လာကြရီ။

ပထမဦးဆုံး စက်ခန်းကား ပါးစပ်ဖြစ်သည်။ ပါးစပ်တွင် ကိုက် ဖြတ်ရန်၊ ထုချောရန် 'ကရိယာ' ရှိသည်။ အပေါ်ပိုင်း ချွန်ထက် သော ရွှေသွားသည် အစာဖြတ်ရန် စားဖြစ်သည်။ အပေါ်ဖက် ချွန်ထက်သော အံ့စွယ်သွားသည် အစာညှပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အံ့သွား များသည် ကြိတ်ချောရန် အသုံးဝင်သည်။ အရိုးများသည် ထိုပါး စပ် စက်ခန်းတွင် ဖြတ်၊ ထု ကြိတ်ချောခံရခြင်းကြောင့် ကြေမှုရတော့ သည်။ လျှာသည် ယောက်မမေ့တဲကဲ့သို့ ဝင်ရောက် ကုမေ့ပေး သေးသည်။

လျှာသည် အစာများကို လည်ချောင်းသို့ ပို့ပေးသောအခါ အရိုးကြေချားသည် ဓာတ်လှေကားထပ်စီးရသကဲ့သို့ အစာမြှန်၏ လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် ခုတ်သစ်စက်ခန်းဖြစ်သည့် အစာအိမ်သို့ ချောက် သည်။

ဤအစာအိမ် စက်ခန်းသည် ဓာတ်ချက်သော 'ဓာတုစက်ခန်း' ဖြစ်သည်။

အစာအိမ်သည် အစာကုန်ကြမ်းများ ရောက်လာမည်ကို ခြို တင်သိရှိထားသည်။ -ထိုကြောင့် အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရန် အား လုံးအသင့် ဖြစ်နေသည်။ ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ် အက်ဆစ်နှင့် ဆား ရေဒီးသည် ဓာတုစက်ရုံတွင် အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။ အစာ အိမ်တွင် မူလကဆည်းက ဆား-ရဲဒီး လက်ကွက်ရှိသည်။ ကုန် သစ်များကို အဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်နေသည်။



‘ဓာတ်ကူပစ္စည်း’ ဟူသော အမည်ကို ကြားဘူးကြပေလိမ့်မည်။ အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်ရန် ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုက်ကို အပူပေးသော အခါ မန်းဂန် ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို ဓာတ်ကူ ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုရသည်။ မန်းဂန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ကူပစ္စည်း နှိုင်းကြောင့် အောက်စီဂျင်ဓာတ် လျင်မြန်စွာ ထွက်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ယခု ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝင်စားခြင်းမှာ ဤဓာတ်ကူပစ္စည်း မဟုတ်ပဲ ခွေးနှင့် ကြောင်တို့ ထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းသာ ဖြစ်သည်။ ယင်းဓာတ်ကူ ပစ္စည်းကို ကဇော်ဖောက်ဓာတ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ အကယ်၍ တူညီသော ‘လုပ်ငန်း’ ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါလျှင် ယင်းသည် မင်းဂန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်ထက် အဆပေါင်းများစွာ စွမ်းအင်ပိုရှိသည်။

အရိုးသည်အမာခံ ဝမ်းဗားသော်လည်း အတွင်းဦးကား ဥအကာဓာတ် ဖြစ်သော ကယ်လဆီယမ် ဖရိုစဖိတ်နှင့် ကယ်လဆီယမ် ကာဘွန်နိတ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စက်ခန်းတွင် ကြေမှုပြီးရောက်လာသော အရိုးမှ အကြေများသည် အစာအိမ်တွင်းမှ ဆားငရဲမီး၊ ကဇော်ဖောက်ဓာတ်တို့၏ ရောနှံမှုကြောင့် ကော်ရည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားတော့သည်။

ထို့နောက် အခြားဓာတ်စုစက်ခန်းသို့ ပို့ခြင်းခံရပြန်သည်။ ထိုစက်ခန်းသည် အူဖြစ်သည်။ အူအတွင်း၌ ကော်ရည်များကို တကျီကျီ တကုကုနှင့် လုံးထွေးပြီး ရေတွင် ပျော်ဝင်စေသည်။ ရေတွင် ပျော်ဝင်တော့မှ ကိုယ်ခန္ဓာကွင်းသို့ စုတ်ယူနိုင်တော့သည်။ အာဟာရအဖြစ် စုတ်ယူရန် မလိုတော့သော အစာကျန်များကိုမူ စအိုဝမှ ထုတ်ပစ်ရတော့သည်။


မြက်စားတိရစ္ဆာန်များ၏ ‘အစာချေစက်ရုံ’ ကို ကြည့်ပါဦး။ ထိုစက်ရုံရှိ စက်ခန်းများ၏ တာဝန်မှာ ဖြတ်ခုတ်ကြိတ်ရန်သာ ပြုလုပ်ရသည်။ ညှပ်ရန် အစွယ်မပါရှိချေ။ ‘ခါတုစက်ခန်း’ များသည်

ကျယ်ပြန့်သည်။ ခွေးကြောင်ကဲ့သို့ အစာအိမ်တခုတည်းမဟုတ်ပဲ သုံးလေးခုရှိသည်။ ခွေးကြောင်တို့၏ အူပိတ်များသည် ကျုံ့လိုက်လျှင် သေးသေးငယ်ငယ်လေးကျန်သည်။ မြက်စားတိရစ္ဆာန်များ၏ အူပိတ်မှာ အလွန်ကြီးသည်။ ထိုထုထွက်ကြီးသော အူပိတ်နှင့် အစာအိမ်များသည် မြက်စား၏ ကဇော်ခန်းနှင့် သိုလှောင်ခန်းဖြစ်သည်။ မြက်စားတိရစ္ဆာန်များ၏ ‘ခါတုစက်ခန်း’ တွင် သက်ရှိအရာငယ် များစွာရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ ကဇော်ဖောက်ကောင် များဖြစ်သည်။ ၎င်းပြင် ကဇော်ဖောက်ဓာတ် လည်း များစွာရှိသည်။ သို့သော်လည်း ခွေးကြောင်တို့၏ ‘ခါတုစက်ခန်း’ ရှိ ကဇော်ဓာတ်နှင့်မတူချေ။ ယင်းတို့၏တာဝန်မှာ ကဇော်ကောင်များကို ကူညီလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သစ်ပင်တစ်ရှူးများကို ခွေးနှင့် ကြောင်တို့ အစာမချေနိုင်သော်လည်း မြက်စားတိရစ္ဆာန် အတွက်မူ ကဇော်ဖောက်ကောင်များ၏ ကူညီမှုကြောင့် အာဟာရဓာတ် များစွာရရှိသည်။

၅၀။ ။ ဆင်ကပ်ပွဲထဲမှ ခွေးကလေးများဂဏန်းသင်္ချာတွက်တတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

ဆင်ကပ်ပွဲတခုတွင် ခွေးငယ်ငါးကောင် စင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်လာပြီး စာသင်ခုံများတွင် ထိုင်နေကြသည်။ ဆရာမက ဂဏန်းသင်္ချာပစ္စည်းကို မေးသောအခါ ခွေးငယ်များ အဖြေမှန် ပြန်၍ဖြေကြသည်။ ပရိသတ်များကား ပျော်ရွှင်မြူးတူး အံ့ဩနေကြသည်။ ခွေးငယ် တကယ်သင်္ချာတတ်ပါသလော...။ ခွေးငယ်သည် လူကဲ့သို့ တစ်နှင့်တစ်ပေါင်းလျှင် လေပစ် နှစ်ရသည်ကို သိပါ၏လော။

လူဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေ အမူအယာများစွာကို မွေးကတည်းက သရုပ်ဆောင်တတ်သည်။ ဥပမာ၊ မွေးစက လေးငယ်သည်



နို့စို့တတ်သည်။ မွေးစခွေးငယ်လည်း နို့စို့တတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သင်ကြားခြင်းမရှိပဲ မွေးကတည်းက တတ်မြောက်သာ အမူအယာကို 'ကန့်သတ်ချက်မဲ့ ပြန်ဟပ်ခြင်း' ဟုခေါ်သည်။

ဆပ်ကပ်ပွဲထဲမှ ခွေးကလေးများ ဂဏန်းသင်္ချာ တွက်ဘတ်ခြင်း မှာ အစဉ်မပြတ် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းကြောင့် ဂဏန်းစာလုံးကိုမှတ်မိပြီး ထိုဂဏန်းစာလုံးကို မြင်သောအခါ အဖြေမှန် အော်ပြောနိုင်သည်။ ဤသို့ နှစ်ရှည်ကာလကြာစွာ လေ့ကျင့်ပေးသောအခါ ဂဏန်းစာလုံးသည် ခွေး၏ ဦးနှောက်တွင် ဥပမာပုံမိနေပြီး အမူအယာအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာတော့သည်။ ထိုကြောင့် ထိုဂဏန်းစာလုံးကို မြင်သောအခါ မူတည်သောအော်သံဖြင့် အော်လိမ့်မည်။ ဤသို့ လူတို့ လေ့ကျင့်ပေးမှုကြောင့် အသိအမူအယာ ဝင်ခြင်းကို 'ကန့်သတ်ပြန်ဟပ်ခြင်း' ဟုခေါ်သည်။


ထိုပြန်ဟပ်ခြင်း ကိုလူသားတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝတွင်လည်း တွေ့တွေ့ရသည်။ ယင်း ပြန်ဟပ်ခြင်းကို ဆိုဗီယက်စိတ်ပညာပညာပေါ်မောက်တဦး၏ အကြံကြော်ငြိမ်းစမ်းသပ်ခြင်းမှ သက်သေထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

၅၁။ ။ တိရစ္ဆာန်ဆပ်ကပ်ဆရာသည် သားရေကြာပွတ်ကို အဘယ်ကြောင့် ကိုင်ဆောင်ထားရသနည်း

ဆပ်ကပ်ပြပွဲတွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရိုင်းတို့ စင်မြင့်ပေါ်တွင် ပြသသောအခါ ဆပ်ကပ်ဆရာ၏ ကိုယ်တွင် လက်နက်ဆောင်ထားလေ့ရှိသည်။ 'သတိကူသည် ပိုမိုသည်မှရှိ' ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်ကဲ့သို့ ဆပ်ကပ်ဆရာ၏ ထုတ်ထဲကွင်း သားကြောပွတ်ကိုလည်း ကိုင်ထားပြန်သည်။

ဆပ်ကပ်ဆရာ၏ ကိုယ်တွင် ခုခံကာကွယ်ရန် ကိုယ်ဆောင်လက်နက်ရှိနေပြီပဲ လက်တွင် ကြာပွတ် ကိုင်ထားဖို့ လိုသေး၏လော...။

အကြောင်းရင်းကား ဤသို့တည်း။ တိရစ္ဆာန်များသည် ထိုလှုပ်ရှားနေသော ကြာပွတ်ကို ကိုယ်တွင် ဆောင်ထားသော လက်နက်ငယ်ထက် ပို၍ ဂရုပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်များ၌ လှုပ်ရှားနေသော အရာဝတ္ထုများကို ပို၍ ဂရုပြုသော အလေ့အကျင့်ရှိသည်။ ဥပမာ ခွေးသည် ယုံနေသော ငှက်များ၊ ပြေးလွှားနေသော တိရစ္ဆာန်နှင့် လူတို့ကို ပို၍ ဂရုပြုမိသည်။ တိရစ္ဆာန်ရိုင်းများသည် လူတို့ဝတ်ဆင်ထားသော အဝတ်ကို လူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ဝတ်တဒေသအဖြစ်မြင်သည် ယူဆသည်။ လက်တွင်ကိုင်ထားသောတုတ်၊ သားရေကြာပွတ်ကိုလည်း ထိုနည်းတူစွာ လူ၏အစိတ်အပိုင်းဘာခု အဖြစ် မြင်သည်။ ခွေးဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်ရိုင်းများဖြစ်စေ အရိုင်းစိတ် ဖောက်ပြန်လာသောအခါ လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ခုန်ကိုက်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ခုန်ကိုက်သောအခါ လှုပ်ရှားနေသော လက် (သို့) လက်တွင် ကိုင်ထားသော ကြာပွတ် စသည်တို့ကို ပထမဦးဆုံး ခုန်ကိုက်လေ့ ရှိသည်။ ဆပ်ကပ်ဆရာသည် တိရစ္ဆာန်ရိုင်း၏ ဤလေ့ကို အသုံးပြုပြီး လက်တွင် ကိုင်ထားသောတုတ်၊ ကြာပွတ်ကို လှုပ်ရှားခြင်းဖြင့် ယင်းတို့၏ ဂရုစိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး အမျိုးမျိုးသော အမူအယာလုပ်နိုင်စေသည်။ အကယ်၍ ထိုတိရစ္ဆာန်ရိုင်းများ အရိုင်းစိတ်ဝင်ပြီး ဆပ်ကပ်ဆရာကို ခုန်ကိုက်ပါက လက်တွင် ကိုင်ထားသော လှုပ်ရှားနေသည့် ကြာပွတ်ကိုသာ ပထမခုန်ကိုက်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆပ်ကပ်ဆရာ ရှောင်ရှား ခုခံနိုင်လေတော့သည်။ ထိုကြောင့် ဆပ်ကပ်ဆရာ ကြာပွတ် ကိုင်ထားခြင်းမှာ လုံခြုံရေးအတွက် ဖြစ်သည်။



### ၅၂။ ယုန်၏နားရွက် အလွန်ရှည်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

တိရစ္ဆာန်များတွင် ယုန်၏နားရွက်သည် အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယုန်၏ နားရွက်ရှည်ခြင်း အကြောင်းကို ဤသို့ အမျိုးမျိုး အဆိုပြုကြသည်။


လူတို့ ယုန်ဖမ်းသောအခါ နားရွက်ချည်း ဆွဲကိုင်လေ့ရှိသောကြောင့် ဟူ၍၎င်း၊ ယုန်သည် မိမိ၏အစွယ်သွားကို အခြားတိရစ္ဆာန်သို့ပေးပြီး အခြားတိရစ္ဆာန်ထံမှ နားရွက်တစ်ခု ပြန်ယူခြင်းကြောင့် ဟူ၍၎င်း၊ ယုန်သည် တရပ်နှင်းသီးကို စားခြင်းကြောင့် နားရွက်ရှည်လာသည် ဟူ၍၎င်း အဆိုပြုကြသည်။ လက်တွေ့တွင် ယုန်သည် နားရွက်ကို အများဆုံး အသုံးပြုသော တိရစ္ဆာန် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤမျှ ရှည်လျားသောနားရွက် ရှိမှသာလျှင် ယင်းအသက်ရှင်ရေးအတွက် အကျိုးပြုလိမ့်မည်။

နားရွက်ရှိသော သတ္တဝါများသည် အရာဝတ္ထု အမျိုးမျိုးမှ ထွက်လာသောအသံကို ခွဲခြားရာတွင် နားရွက်ကို အသုံးပြုသည်။ နားရွက်ကို အပိုင်းသုံးပိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။ ယင်းတို့မှာ အပြင်နား၊ အလယ်နားနှင့် အတွင်းနားတို့ ဖြစ်ကြသည်။

နား၏အပြင်ဖက်ဆုံး ဖူထွက်နေသည့် နားရွက်ကြီးကို 'နားရွက်အနားကြီး' ဟုခေါ်ပြီး အရပ်လေးမျက်နှာမှလာသော အသံလှိုင်းကို စုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကြောင့် နားရွက်အနားကြီးလေလေ အသံ ညည်းလျှော့စွာ ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ နားရွက်

အနားကို အရပ်လေးမျက်နှာသို့ ကြိုက်နှစ်သက်သလိုလှည့်၍ ရမည်ဆိုလျှင် ကြားရသော အသံများ ပိုကြည်လင်မည်ဖြစ်ပြီး ပို၍လည်း ရပ်ဝေးမှ အသံများကို ကြားရသည်။ ယုန်နားရွက်အနားကို ယုန်၏ နားရွက်အနားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အလွန် သနားစွယ်ငယ်သည်ဟု ဆိုရမည်။ ၎င်းပြင် ယုန်နားရွက်အနား၏ လှုပ်ရှားသော ကြွက်သားလည်း ယောက်ကွယ်နေပြီး လှုပ်ရှားစွမ်းအင်မရှိခြင်းကြောင့် ယုန်၏ နားရွက်အနားကဲ့သို့ လှုပ်ရှားလှည့်လည်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်တော့ချေ။ သို့သော်လည်း အမြင့်စားသတ္တဝါတွင်လူမှ အပ ကျန်ရှိသော တိရစ္ဆာန်များ၏နားရွက်အနားသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လှုပ်ရှားနိုင်ကြသည်။

ယုန်သည် ကောက်ပဲသီးနှံ၊ သစ်ရွက်၊ မြက်၊ ဟင်းရွက်စသည်တို့ကို စားသုံးသည်။ ယင်းသည် အခြားတိရစ္ဆာန်များကို အန္တရာယ်မပြုနိုင်ချေ။ မြေခွေး၊ မြွေပါကြီး၊ ဇီးကွက်၊ လင်းယုန်တို့၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ သတိမထားလျှင် အစားခံရနိုင်သည်။ ယုန်သည် တိုက်ခိုက်ခံရသောအခါ ဦးချိုဖြင့်၎င်း၊ သွားဖြင့်၎င်း၊ အနံ့ဆိုးထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၊ ခုခံကာကွယ်ခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်များတွင် စိတ်နေသဘောထား အနူးညံ့ဆုံးဖြစ်သည်။ ယင်း၏တခုတည်းသော စွမ်းရည်မှာ အပြေးလျင်မြန်ခြင်းပေတည်း။ ထို့ကြောင့် 'သတိဟူသည် ပိုသည်မရှိ' ဟူသည့်စကားကဲ့သို့ အစဉ်အမြဲ နားရွက်ကြီးထောင်ပြီး အရပ်လေးမျက်နှာမှ အခြေအနေကို သတိကြီးစွာဖြင့် ဂရုပြုရသည်။ ရှည်လျားသောနားရွက်ရှိမှသာ ကျီးလန်စာစားနိုင်ရုံရှိမည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝ၏ သဘောတရားသည် သတ္တဝါတိုင်း မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် သင့်လျော်သော ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါများ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်။



၅၃။ ။ ကြွက်များ၊ အဘယ်ကြောင့် ပစ္စည်းများကို ကြိတ်ရသနည်း။

လူတို့ ကြွက်ကို မြင်လျှင် အော်ဟစ်ကြသည်။ ခဲနှင့်ပေါက်ကြသည်။ လူတိုင်းက မုန်းတီးသော တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် အစာခိုးစားသည်သာမက စက္ကူများ၊ အင်္ကျီများ၊ သေတ္တာများ၊ နံများ၊ ကုလားထိုင်များ စသည့် အိမ်သုံးပရိဘောဂများကိုလည်း ဖျက်ဆီးလေ့ရှိသည်။ ဧရာဝတီလည်း ပြန်ပွားပေးတတ်သည်။ ထိုကြောင့် ကြွက်နှိမ်နင်းပွဲများ လုပ်လေ့ရှိကြသည်။

ကြွက်သည် အဘယ်ကြောင့် ပစ္စည်းများကို အမြဲတစေ ကိုက်ဖျက်ရသနည်း။ ဤမေးခွန်းကို ဖြေရန်မှာ သွား၏ တည်ဆောက်ပုံကို သိရပေမည်။


ကြွက်သွားတွင် သွားခွီး၊ သွားလည်ကုတ်၊ သွားမြစ်ဟူ၍ သုံးပိုင်းရှိသည်။ သွားမြစ်သည် သွားဖုံး၏ ချိုင့်နေသော နေရာထဲတွင် ရှိပြီး သွားလည်ကုတ်နှင့် သွားခွီးသည် သွားဖုံးအပေါ်တွင်ရှိသည်။ သွား၏ အပြင်ဖက်အလွှာသည် သန်မာသော အမာဓာတ် ဖြစ်ပြီး အတွင်းလွှာသည် အနည်းငယ် ထူသော သွားဓာတ် ဖြစ်သည်။ အလယ်လွှာသည် အခေါင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကို ခြင်ဆီခေါင်းဟု ခေါ်သည်။ ယင်းတွင် သွားပေါက်ခြင်းကို အားပေးသော သွားခြင်ဆီရှိသည်။ အချို့ တိရစ္ဆာန်များ၏ သွားခြင်ဆီသည် တသက်လုံး တည်ရှိနေသည်။ အချို့ တိရစ္ဆာန်များသည် သွားများ ပြည့်အစုံပေါက်ပြီးသောအခါ သွားခြင်ဆီ ပျောက်သွားတော့သည်။ ကြွက်

၏ အပေါ်၊ အောက် သွားဖုံးရှိ ရှေ့သွား၏ ခြင်ဆီသည် အမြဲရှိသည့် ပြင် အမြဲ မရပ်မနား ကြီးထွားနေသည်။ ရှေ့သွားများ အလွန်ရှည်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်၎င်း၊ အစာစားခြင်းကို ထိခိုက်ခြင်း မရှိရန်၎င်း၊ မာကျောသော ပစ္စည်းများကို အမြဲကိုက်ခြင်းဖြင့် ရှေ့သွားကို ပွတ်တိုက်ရသည်။ သို့မှသာ ရှေ့သွားယိုသည် ရှည်ရှည်ကြီး ဖြစ်မနေတော့ပဲ ရှိလိမ့်မည်။

စမ်းသပ် ကြည့်ရှုချက်အရ ကြွက်ကို လေပေါက်ရှိသော သတ္တု သေတ္တာတွင် ထားပြီး ယင်းကို အစာပျော့ များသာ ကွေးသည်။ သတ္တုသေတ္တာတွင် ရှေ့သွား ပွတ်တိုက်ရန် မာကျောသော ပစ္စည်း မရှိခြင်းကြောင့် ကာလအတန်ကြာသောအခါ ကြွက်၏ ရှေ့သွားသည် ယခင်ထက် များစွာ ရှည်လာသည်ကို စမ်းသပ် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။

၅၄။ ။ ဆင်နှင့် ကြို့ ရေချိုးပြီး သော အခါ ကိုယ်ပေါ် ချွံသဲများ ပက်ဖြန်းလေ့ ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

သင်ယုံချင်ယုံ၊ မယုံချင် ပုံပြင်သာ မှတ်လိုက်ပါ။ လူတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာညစ်ပတ်၍ ဆေးကြောရန် ရေချိုးကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များလည်း ထိုနည်းတူပင် ရေချိုးကြသည်။ သို့သော်လည်း ဆင်နှင့်ကြို့သည် ရေချိုးပြီးသောအခါ ကိုယ်ပေါ်သို့ ချွံသဲများ ပက်ဖြန်းကြသည်။ ပက်ဖြန်းရုံမျှမက အတန်ငယ် ထူထူတထုံ လိပ်းကျံထားရသည်။ 'ပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ဆေးထိုး၊ ဆေးသမ္ဘက်ကြောင့်လေး' ဟုသိပ္ပံ ဆိုရိုးစကား ကဲ့သို့ဖြစ်နေပေသည်။ ဆင်နှင့်ကြို့တို့ကို စိတ်နှောက်နေသည့် ဟု သင်ထင်လိမ့်မည်။



ဤသို့ထင်လျှင် သင်အမှားကြီးမှားလိမ့်မည်။ ဆင်နှင့်ကြို့ အတွက် မူ ဤသို့မပြုလျှင် မဖြစ်သော အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ဆင်နှင့်ကြို့၏ အရေခွံများသည် အလွန်ထူသည်။ သာမန် သေနတ်နှင့် ပစ်၍ မဖောက်နိုင်ဟုဆိုကြသည်။ ယင်းတို့၏အရေခွံ အက်ကြောင်းကြားတွင် အလွန်ပျော့၍ ပါးသော နေရာများစွာရှိသည်။ အပိတ်ပင် ထိုးဖောက်နိုင်သည်။ အပူပိုင်းဒေသ၏ သွေးစုတ်ပိုးကောင် (ဥပမာ၊ ခြင်၊ ယင်နှင့် မှက်စသည်တို့) ၏ နှုတ်သီးသည် အလွန်အစွမ်းရှိသည်။ အချို့ ဒေသများတွင် ဤသွေးစုတ်ပိုးကောင်များ အလွန်များခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်များ ထိုဒေသသို့ ပင် မဝင်ဝံ့ချေ။ ဤသွေးစုတ်ပိုးကောင်များသည် ဆင်နှင့်ကြို့ စသည့် ကြီးမားသော သွေးပူသတ္တဝါ၏ အရေခွံ အက်ကြောင်းတွင်းသို့ ဝင်ပြီး အားကုန် ကိုက်ခဲခြင်းကြောင့် သတ္တဝါကြီးများ ယားနာခြင်းခံစားရသည်။ သွေးပူသတ္တဝါများသည် ရေချိုးပြီးသောအခါ သာမန်အချိန်မျိုးထက် အရေခွံသွေးကြောများ ပို၍ ဖောင်းကြီးလာသည့်ပြင် သွေးစုတ်ပိုးကောင်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် အနံ့တမျိုး ထွက်လာလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆင်နှင့်ကြို့များ ရေချိုးပြီးသောအခါ ရွံ့သဲများကို ကိုယ်ပေါ်တွင် လိမ်းကျံခြင်း ဖြစ်လေသည်။

၅၅။ ။ သဘာဝအလျောက်သေဆုံးသော ဆင်အလောင်းကို မည်သူမျှမတွေ့ရချေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း


ခြင်္သေ့ကို တိရစ္ဆာန်ဘုရင်ဟု ပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဆင်သည်လည်း အားကောင်းသော တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သည်။ စူးစမ်း လေ့လာရေး ပါရဂူများ၏ လေ့လာချက်အရ ဆင်နှင့်

တကိုယ်တည်း တိုက်ခိုက်ရုံသော တိရစ္ဆာန်ရိုင်း အလွန်နည်းသည်ဟု သိရသည်။ ကျားသစ်၊ ခြင်္သေ့များ၊ ဘုရင်ဘွဲ့ ရနေသော်လည်း ဆင်ကိုမြင်လျှင် ရှောင်ရှားနေလေ့ရှိသည်။ ကျားသာလျှင် တခါတရံဆင်ကို 'ဖိမ်'ခေါ်ရသည်။ ဤအတိုင်းသာဆိုလျှင် ဆင်သည်လည်း တိရစ္ဆာန်ရိုင်းများတွင် ဗိုလ်တပါးဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ယင်း တိုက်ခိုက်မခံရလျှင် ဖိတ်ကောင်းသော တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ တောဆိတ်၊ သမင်၊ ငှက်ပေါင်းစုံတို့နှင့် အလွန်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်လေ့ရှိသည်။

လူသည် ဆင်နှင့် ရင်းနှီးသော်လည်း သဘာဝအလျောက် ဆင်ဘယ်ကဲ့သို့ သေသည်ကို၎င်း၊ သဘာဝအလျောက် သေဆုံးသော ဆင်၏အလောင်းကောင်ကို၎င်း မည်သူတဦးတယောက်မျှ မတွေ့ရှိခဲ့ရချေ။ သတ္တဗေဒပညာရှင် လူတို့သည် ဆင်သင်းချိုင်းကိုရှာရန် အားထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဆင်သည် ထိုလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးကို ကြပ်တည်းစွာ စောင့်ထိန်းထားခြင်းကြောင့် - လူများ ဆင်သင်းချိုင်းကို ရှာဖွေမတွေ့ခဲ့ရသေးချေ။

သီလိန်ကျွန်းပေါ်ရှိ ပြည်သူများ၏အဆိုမှာ ဆင်များ အိုမင်း၍ မသန်စွမ်းသောအခါ သေရတော့မည်ကို သိကြသည်။ ထိုအခါ ဆင်အုပ်မှ ခွဲခွာပြီး ဘကိုယ်တည်း ဘိုးဘေးဘီအင်များကိုသိရှိတ်ထားသောနေရာ.... ကျွန်း၏ နက်ရှိုင်းသော အပိုင်း၊ သွားလမ်းလာလမ်း မပေါက်သော ရှေးဟောင်းမြို့ရိုး တည်ရာသို့ သွား၍သေပွဲဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုရှေးဟောင်းမြို့ရိုးရှိ ပန်းခြံဟောင်းနှင့် ခံတပ်ကြီးတွင် ဆင်ရိုးများဖြင့် စုပြုံနေသည်ဟု ဆိုကြသည်။

အချို့ စူးစမ်းလေ့လာရေး ပါရဂူများလည်း ဆင်ရိုးတို့ များကို အမှန်တကယ် တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း သတ္တဗေဒ ပညာရှင်များ၏ ယူဆချက်မှာ ဤအရိုးစုကို တွေ့ရန်ဖြင့် ဆင်များ ဤနေရာတွင် စုသေကြသည် ဟုမဆိုနိုင်။ ဆင်ရိုးများ စုပြုံနေခြင်းမှာ



ရေစီးအားကြောင့် လယ်ကွင်းသို့ရောက်လာရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ သတ္တဗေဒ ပညာရှင်များ၏ ထင်မြင်ချက်မှာ- ဆင်များ သေခါနီးတွင် အင်းအိုင်သို့သွားကြသည်။ ကိုယ်ကို အင်းအိုင်ရှိ နက်ရှိုင်းသော ရွှံ့ပွက်များထဲသို့ နစ်မြုပ်စေသည်။ ထိုကြောင့် လူများ ဆင်၏ အလောင်းကို မတွေ့နိုင် ဟုဆိုသည်။ မည်သို့ဆိုစေ သိပ္ပံပညာရှင်များအဖို့ ပိုမိုများသော အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ရရှိမှသာလျှင် ထိုပစ္စည်းကို တိကျ မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြ နိုင်ပေလိမ့်မည်။

၅၆။ ။ သမင်ဖိုတွင် ဦးချိုပေါက်ပြီး အဘယ်ကြောင့် သမင်မတွင် မပေါက်သနည်း။

‘ငယ်ဗမာတောင် ပြိုင်ယင်ရှူးသတဲ့၊ သူ့ကိုယ်လုံးက အမူဝို’ သမင်၏လှပသော ကိုယ်ခန္ဓာကို အထက်ပါအတိုင်း ကဗျာစပ်ဆိုထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သမင် အမျိုးပေါင်း ၄၀ ကျော် ရှိသည်။


‘ပန်းခက် ပန်းခိုင် ပမာလားသို့ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား သူ့ဦးချို’ သမင်၏လှပသော ဦးချိုသည် ကဗျာဆရာများ၏မုက်စေ့ တွင် ပန်းခက် ပန်းခိုင်နှင့် တူနေသည်။ သို့သော်လည်း အလွန် နည်းသော သမင်မျိုးမှအပ ယေဘုယျအားဖြင့် သမင်ဖိုတွင် ဦးချိုရှိပြီး သမင်မတွင် မရှိချေ။ သမင်ဦးချို၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် နွားချို၊ ဆိတ်ဦးချိုတို့နှင့် တူနေချေ။ သမင်ဦးချိုသည် လှပသည်ပြင်မာကျစ်သည်။ တဖန် သမင်ဦးချိုသည် နွားနှင့်ဆိတ်ချို တို့ကဲ့သို့ တသက် တကြိမ်သာ ပေါက်ခြင်းဟုတ်ပဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တကြိမ်လဲသည်။ ဦးချိုသစ်များကို နှစ်ကာလဖြတ် ရသည်။ ကာလဦးတွင် ဦးချိုပျော့ပြီးသွေးကြော

များဖြင့်ပြည့်နေသည်။ နောက်ပိုင်းကာလတွင်မူ အလွန်မာကျောလေတော့သည်။

သမင်သည် ဆိတ်ငြိမ်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်သော တိရစ္ဆာန်ရိုင်းဖြစ်သည်။ အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့် ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရန်သူကို မြင်သောအခါ တခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ‘ထွက်ပြေး’ တိမ်းရှောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်ထားသည်။ ယင်းတို့သည် အပြေးချန်ပီယံများ ဖြစ်ကြခြင်းကြောင့် လက်နက်မလှုံချေ။ သမင်မတွင် ဦးချို မပေါက်ခြင်းမှာလည်း ဤယူဆချက်ကို ဖော်ပြနေသည်။

ဤသို့ဖြစ်ပါက သမင်ဖိုတွင် အဘယ်ကြောင့်ဦးချိုပေါက်ရသည်နည်း။

သမင်အုပ်တွင် ပဒေသရာဇ်ဆံသော ဓလေ့ရှိသည်။ ယင်းမှာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း လွတ်လပ်မှု မရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သမင်ဖိုများသည် အခွင့်အရေးယူလွန်းသည်။ ယင်းတို့မျိုးစပ်ချိန်သည် မိုးကုန်ဆောင်းကူးရာသီဖြစ်သည်။ ထိုရာသီသည် သမင်ဖိုများ၏ဦးချိုများ မာကျောခြင်းပြီးဆုံးသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သမင်ဖိုသည် အရက်ဦး ဆိတ်ငြိမ်သောအချိန်ကို အသုံးပြုပြီး တောင်ကုန်းလေးပေါ်တက်ကာ ချစ်တေးသံဆိုသည်။ ထိုအခါ အတွဲမရှိသေးသော သမင်ပျိုမများက တေးသံနောက်သို့ ပြေးလိုက် သွားလေသည်။ သမင်ပျိုမကို သမင်ဖိုက သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း မျိုးစပ်ချိန်တွင် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားခြင်းမပြုရတော့ချေ။ အခြားစုံတွဲများနှင့် ဆုံမိကြလျှင် သမင်ဖိုချင်း တိုက်ခိုက် ကြတော့သည်။ နိုင်သူသည် ရှုံးသူ၏ သမင်မများကို ယူကြတော့သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသန်မာ ထွားကျိုင်းသော သမင်ဖိုသည် သမင်မ ဆယ်ကောင်ကျော်မျှ ယူထားလေ့ရှိသည်။





၅၇။ ။ ကုလားအုပ်သည် သဲကန္တာရတွင် ရေရှိသော နေရာကို သိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

ကုလားအုပ်သည် သဲကန္တာရ၏ အသင့်လျော်ဆုံးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ရေရှားသော အခြေအနေအောက်တွင် အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။ သဲကန္တာရထဲမှ ကြမ်းတမ်းသော သစ်ပင်များကို အစာအဖြစ် စားသုံးသည်။ အပူဒဏ်နှင့်အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထိုအသေများရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို များစွာ အထောက်အကူပေးသည်။ ထိုကြောင့် 'သဲကန္တာရသင်္ဘော' ဟု၌ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။


ကုလားအုပ်သည် သဲကန္တာရ အခြေအနေနှင့် အလွန်သင့်လျော်သည်။ ယင်း၏ ခြေလေးချောင်းသည် ရှည်ပြီး လှုပ်ရှားမှု ဖျတ်လတ်သည်။ ခြေလှမ်းကျွံဖြင့် ရှေ့သို့ချီတက်နိုင်သည်။ ခြေစဝါးတွင် တွန်းကန်အားရှိသော အသားများရှိသည်။ သဲထဲသို့ မနစ်ရန်ဖြစ်သည်။ မုက်စေ့ပေါ်တွင် ထု၍ကြီးသော မုက်ခုံးမွေးရှည်ကြီးရှိသည်။ သဲမှန်များ မုက်စေ့ထဲ မဝင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နှာခေါင်းပေါက်စောင်းနေပြီး အလိုအလျောက် စွင့်ပိတ်နိုင်သည်။ ခံသဲများ ဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းပြင် ကြွက်သားတွင် အနံ့ခံ ဆဲလ် ပို၍စုစည်းနေခြင်းကြောင့် အစာများ ရှာနိုင်သည့်အပြင် ဓရကြောကိုလည်း ဖျတ်လတ်စွာ ရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုကြောင့် ခြောက်သွေ့သော သဲကန္တာရတွင် အလွန်ဝေးသော နေရာမှပင် ရေ၏စိစွတ်ခြင်းကို သိရှိနိုင်သည်။ တဖန် ယင်းတွင် မြင့်မားသော ကိုယ်ခန္ဓာရှိခြင်းကြောင့် ရေရှိရာသို့ ဦးတည်လိုက်ပြီး တလှမ်းတလှမ်း ရှာဖွေနိုင်သည်။



၅၈။ ။ နွားမများ သီချင်းသံ ကြားသောအခါ နို့ရိုထွက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း

နွားမကြီးထုတ်သော နို့ရည်၏ နှုန်းနှင့် အရည် အချင်းသည် ယင်း၏အသက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် အဖုံဖုံသော ပြင်ပတို့ပြန် ပြောင်းလဲမှုတို့ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ နွား၏ အသက်သည် နို့ရည်ထွက်မှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ နို့ဖျိုသော နွားမတွင် နို့ရည်အဆက်မပြတ်များစွာရှိသည်။ တဖြည်းဖြည်း အိုမင်းလာကာ နို့ဂလင်းများ ထွားကျိုင်းခြင်း ယုတ်လျော့လာခြင်းကြောင့် နို့ရည်ထွက် လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ နွားမသည် ပထမမှ ဆဋ္ဌမအကြိမ်ထိ နို့ထွက်ကာလတွင် နို့ရည်များအထွက်တိုးလေ့ရှိသည်။ ဆဋ္ဌမအကြိမ်၏ နောက်ပိုင်းကာလတွင် နို့ထွက်ရော အရည်အချင်းပါ ခံချိန်မကိုက် ဖြစ်လာသည်။ အိုမင်းလာသောအခါ နို့ထွက် တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာရုံမျှမက အဆီလည်း နည်းချိန်နည်းချိန်လာသည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ အစာကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း၊ မွေးမြူမှုစု စောင့်ရှောက်သောစနစ် စသည့် ပြင်ပအကြောင်းရင်းများလည်း နို့ရည်ဖြင့်ပေါ်ခြင်းကို ထနည်းတဖုံ ပြုပြင် ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် မွေးမြူမှုစု စောင့်ရှောက်သောစနစ်သည် နွားနို့ထုတ်နှင့် အရည်အချင်းကို များစွာ ဖန်တီးပေးသည်။ အစာတွင် ဥပမာ ဥအကာဓာတ် (ပရိုတင်း) ပြည့်ဝပြီး ထြက်နစ်နားများ မီတာမင်နှင့် သောက်ရေ ကောင်းမွန်လျှင် နို့ထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အချင်းကို မြှင့်စေနိုင်သည်။ မွေးမြူမှုစု စောင့်ရှောက်ရေး စနစ်ကောင်းလျှင်လည်း နို့ထွက်ကောင်းသည်။ တဖန် နွားများ သန့်



ရှင်းစွာရှိခြင်း၊ လေကောင်းလေသန့်ဝင်ထွက်နိုင်ခြင်းနှင့် သင့်တော်သော ကွင်းပြင်တွင် လှုပ်ရှားခြင်း၊ နို့အိမ်ကို အမြဲနှိပ်နယ် ပွတ်ပေးခြင်း၊ စသည်တို့လည်း နို့ရည်ထွက်နှုန်းနှင့် အရည် အချင်းကို မြှင့်စေသည်။

ဤသို့ဆိုလျှင် နို့ညစ်စဉ် နွားကို သီချင်းသံ ကြား စေခြင်းဖြင့် အဘယ်ကြောင့် နို့ပိုထွက်နိုင်သနည်း၊ ဤသည်မှာ ရှိထွက်သော ဖြစ်စဉ်၏ ရှုပ်ထွေးသော ခန္ဓာဗေဒတောတရားဖြစ်သည်။ နာမ်ကြောအဖွဲ့၏ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှ တုံ့ပြန်မှုသည် တိရစ္ဆာန်၏ သဗ္ဗါရုံ၊ ဂန္ဓာရုံ၊ ရူပါရုံ စသည်တို့ကို နှိုးဆွပေးနိုင်လျှင် နို့ထွက်နှုန်းကို ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချို့သည် နို့ပိုထွက်စေပြီး အချို့သည် နို့လျော့ထွက်စေသည်။ နွားကို သီချင်းသံ လှင့်ပေးသောအခါ ဦးနှောက်ကြီး အရေခွံထပ်၏ နှိုးဆွမှုကို တိုးပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် နို့ထွက် တိုးစေသည်။



### ၅၉။ မျောက်များအလွန် အတုခိုးတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

‘အတုမြင် အတတ်တသင်’ ဟူသော ဆိုရိုးစကား ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲတွင် မျောက်ငယ်များ မျောက်ကြီး ဘာလုပ်လုပ် လိုက်အတုခိုးပြီး လုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆပ်ကပ်ထဲမှ မျောက်များ ဆိုင်းမုံတီးတတ်သေးသည်။ တောဆိပ်များကိုအမိန့်ပေး ကပြစေသည်။ မြင်းစီးပြတတ်သေးသည်။ မျောက်များသည် လူတို့၏ သာမန်အမှုအယာများကိုသာ အတုခိုးနိုင်သည်မဟုတ်။ ရှုပ်ထွေးသော လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း အတုခိုးသည်။ လူတစ်ဦး သံရိုက်နေသည်ကို မြင်သောမျောက်သည် သံချောင်းများ ရှာပြီး သစ်သားပေါ်တွင် သံရိုက်သကဲ့သို့ပြုလုပ်သည်။ သုံးလေးကြိမ်မျှ

အတုခိုးပြီးသောအခါ အမှန်ပင် တိတိကျကျ သံရိုက်နိုင်ပေတော့သည်။ အချို့မျောက်များသည် အလွန်ပေးနပ်ပြီး ပြီးခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ၊ ထိုအတွေ့အကြုံနှင့် ဆင်ဘူသော အခြေအနေအောက်တွင် ထိုအတွေ့အကြုံကို ပြန်လည် အသုံးပြုတတ်သည်။ ဤသည်မှာ ဆပ်ကပ်ထဲမှ ဂဏန်းတွက်ဘတ်သော ခွေးနှင့်အခြေအနေမတူချေ။

မျောက်များ အဘယ်ကြောင့် အတုခိုးတတ်သနည်း။ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ဖွံ့ဖြိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျောက်ဝံ၏ဦးနှောက်သည် လူထက်ငယ်သော်လည်း ကိုယ်အလေးချိန်၏  $\frac{1}{25}$  ရှိသည်။ လူ၏ဦးနှောက်သည် ကိုယ်ခန္ဓာအလေး၏  $\frac{1}{25}$  မှ  $\frac{1}{99}$  ထိရှိသည်။ အခြားတိရစ္ဆာန်၊ ဥပမာ ပါးနပ်သော ခွေး၏ဦးနှောက်သည် ကိုယ်အလေးချိန်၏ သုံးရာမှလေးရာပုံတပုံရှိသည်။ မျောက်များ သင်ပင်ပေါ်တွင် နေထိုင်ကျက်စားခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ဖျတ်လတ်မှုနှင့် ကြွက်သားအပြောင်အလဲ ပြုမှုများ ပို၍ လိုအပ်သည်။ ထိုအပြုအမူများသည် ဦးနှောက်ကို ထွားကျိုးခွဲပြီးစေသည်။ ဦးနှောက်ဝင်ရည် အဆက်မပြတ် ကြီးထွားခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ဦး ထုလုံးကြီးထွားလာပြီး ဦးနှောက်ဝမ်းကို လုံးဝ ဖုံးကွယ်ပစ်သည်။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးလေလေ ဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလေလေ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အမူအယာ အမျိုးမျိုးကို အတုခိုး ‘ခလုလာ’ နိုင်သော စွမ်းအားရှိလာသည်။



၅၉။ ။မျောက်များအဘယ်ကြောင့်စားပိုးနှင့်အောင်စားနိုင်သနည်း

ဝေသန္တရာဇာတ်ဘော်တွင် ဣစကာပုံရိက္ခာသည် စားပိုးနှင့်အောင်စား၍သေရသည်။ 'အစားလွန်က စားပိုးနှင့်၍သေတတ်သည်' ဟူသော မြန်မာစကားပုံရှိသည်။ လူများ အကယ်၍ စားပိုးနှင့်အောင်စားလျှင် ဣစကာလို မဖြစ်သော်ငြားလည်း အစာမကြေ၍ အလူးအလိမ့်ခံရလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မျောက်များသည် ရတတ်သမျှ အစားများကို ပါးစပ်ထဲသို့ထိုးသွင်း၍ မဝါးပဲနေသော်လည်း အစာမခွေသေးရောဂါ၊ ဝမ်းပိုက်နာသောရောဂါ မဖြစ်ချေ။

မျောက်များ အဘယ်ကြောင့် စားပိုးနှင့်အောင်စားနိုင်ကြသနည်း။

အမှန်ကား မျောက်များ စားပိုးနှင့်အောင်စားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သေချာစွာ လေ့လာလျှင် မျောက်များ 'အစာကိုလှပြီး ပါးစပ်ထဲ သွင်းသော်လည်း အစာအိမ်ထဲသို့ မျိုချခြင်း မရှိသည်ကိုတွေ့ရမည်။ အဖြစ်အပျက်ကား ဤလိုတည်း။ ယင်း၏ ပါးစပ် နှစ်ဖက်နှစ်ချက်ကွင် အိမ်တခုဆီရှိသည်။ ယင်းတို့ကို 'ပါးအိမ်' ဟုခေါ်သည်။ ပါးအိမ်၏ အဓိက တာဝန်မှာ အစာသိုလှောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသော မျောက်အစာ လှစားခြင်းသည် အစာကိုမျိုချခြင်းမရှိပဲ ပါးအိမ်တွင် ယာယီစုထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ နောက်မှ တဖြေးဖြေး ဝါးစားပြီး အစာအိမ်ထဲသို့ မျိုချသည်။

လူသားတို့ကွင်လည်း ပါးအိမ်ရှိခဲ့ဘူးသည် ဟုဆိုလျှင် သင် အံ့ဩ

နေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ယခုကွယ်ပျောက်နေပါပြီ။ မျောက်သည် လူနှင့်မတူချေ။ ယင်းကို အစာများ မှန်မှန် စားရလိမ့်မည်ဟု မည်သူမျှ အာမခံချက် မပေးချေ။ ထိုကြောင့် စားရ သောက်ရမည့် အခွင့်ကြီးလာပြီဆိုလျှင် အဝစားရမည်ပြင် အနည်းငယ် သိုလှောင်ထားရဦးမည်။ သို့မှသာ ဝမ်းပိုက်နာချိန်တွင် လွယ်လင့်တကူစားနိုင်ပေသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယင်းတို့၏ပါးအိမ်များ ဖွံ့ဖြိုးနေလေတော့သည်။



www.burmeseclassic.com